


Done
10 enda #

Car by 



علم ہندوستوئی

9m878
30/8



نصاب علم ہندسیہ

نشان (۲۲۴)

علم ہندسیہ

Plane Geometry

(برائے انٹر میڈیٹ)

تالیف

شیخ برکت علی صاحب
ریڈر شعبہ ریاضی جامعہ عثمانیہ ایم۔ اے

و
محمد خواجہ محی الدین صاحب
ریڈر شعبہ ریاضی جامعہ عثمانیہ ایم۔ اے

بار دوم

۱۳۶۵ھ ۱۳۵۵ھ ۱۹۴۶ء
مطبوعہ

طبع و اشاعت دارالحدیث




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(747) ناک

مکتبہ اسلامیہ

516

ع 24



دیب اچہ

علم ہندسہ مستوی

ہندسہ مستوی کا یہ مختصر رسالہ حسب تصفیہ مجلس نصاب ریاضی جامعہ عثمانیہ کی انٹرمیڈیٹ کی جماعتوں کے لیے تالیف کیا گیا ہے۔ جہاں تک ممکن تھا ہندسہ مستوی کے نصاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس رسالہ کو اپنی حدود کے اندر مکمل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے چند دفعات جو علامت \times سے نشان زد کی گئی ہیں مضمون کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے نصاب سے زائد درج کی گئی ہیں مگر یہ دفعات اسی ہیں کہ تقریباً جملہ طلباء ان کو آسان اور دلچسپ پائینگے۔ مناسب مشقوں کے انتخاب کی غرض سے متعدد مستند انگریزی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مسائل پر مکمل طور پر حاوی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طالب علم حتی الامکان مسائل کے متعلقہ امثلہ میں مشقوں کی کافی تعداد کو حل کرنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ طالب علم کی سہولت کے مد نظر جہاں ضروری تصور کیا گیا مشقوں کے اشارے یا مکمل حل درج کر دیے گئے ہیں۔ فقط

شیخ برکت علی

المرقوم کیم آبان ۱۳۴۴ھ

محمد خواجہ محی الدین

فہرست مضامین

(علم ہندوستان کی)

| صفحہ | مضمون |
|------|-------------------------|
| ۱ | پہلا باب۔ تمہید |
| ۶ | دوسرا باب۔ نسبت و تناسب |
| ۱۱ | امثلہ ۱ |
| ۲۳ | امثلہ ۲ |
| ۳۰ | امثلہ ۳ |
| ۳۳ | امثلہ ۴ |
| ۴۲ | امثلہ ۵ |
| ۴۷ | امثلہ ۶ |
| ۵۰ | امثلہ ۷ |
| ۵۱ | تیسرا باب۔ مثلث کے خواص |
| ۵۵ | امثلہ ۸ |
| ۵۷ | امثلہ ۹ |

| صفحہ | مضمون |
|------|---|
| ۶۲ | امشله ۱۰ |
| ۶۶ | امشله ۱۱ |
| ۷۳ | امشله ۱۲ |
| ۷۶ | چوتھا باب۔ دائروں کے خواص |
| ۷۷ | امشله ۱۳ |
| ۸۰ | امشله ۱۴ |
| ۸۸ | امشله ۱۵ |
| ۹۵ | امشله ۱۶ |
| ۱۰۲ | امشله ۱۷ |
| ۱۰۴ | پانچواں باب۔ دائروں کا بنانا |
| ۱۰۵ | امشله ۱۸ |
| ۱۱۰ | امشله ۱۹ |
| ۱۱۳ | چھٹا باب۔ اعظم، اقل |
| ۱۲۲ | امشله ۲۰ |
| ۱۲۵ | ساتواں باب۔ چھٹی نسبت، موسیقی صفا اور موسیقی منسل |
| ۱۲۷ | امشله ۲۱ |
| ۱۳۹ | امشله ۲۲ |

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علم ہندسہ توی

پہلا باب

تمہید

۱۔ اس باب میں بطور تمہید ہم ایسے اہم مسائل درج کرتے ہیں جن سے طالب علم کو اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مسائل ثبوت اور توضیحی مثالوں کے ساتھ بالعموم علم ہندسہ کی ان تمام درسی کتابوں میں پائے جاتے ہیں جو مدارس فوقانیہ میں استعمال ہوتی ہیں۔

۲۔ خطوط مستقیم۔

(۱) اگر ایک خط مستقیم ایک اور خط مستقیم سے ملے تو دو متصل زاویوں کا مجموعہ دو قائے ہوتا ہے اور اس کا عکس۔
(۲) اگر دو خط ایک دوسرے کو قطع کریں تو مقابل کے زاویے مساوی ہوتے ہیں۔

(۳) اگر ایک قاطع دو خطوط کو کاٹے اور متبادل زاویے مساوی ہوں تو مؤخر الذکر دو خطوط متوازی ہونگے اور اس کا عکس۔

۳۔ مثلثات اور متوازی الاضلاع۔

- (۱) کسی مثلث کے تین زاویوں کا مجموعہ دو قائموں کے مساوی ہوتا ہے۔
 (۲) دو مثلث ایک دوسرے کے ہر طرح سے مساوی ہوں گے اگر
 (ا) ایک مثلث کے دو ضلع دوسرے مثلث کے دو ضلعوں
 کے جدا جدا مساوی ہوں اور ان ضلعوں سے بننے والے زاویے بھی مساوی ہوں۔
 (ب) اگر ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے
 دو زاویوں کے جدا جدا برابر ہوں اور ایک مثلث کا ایک ضلع دوسرے
 مثلث کے نظیر کے ضلع کے برابر ہو۔
 (ج) اگر ایک مثلث کے تین ضلع دوسرے مثلث کے تین
 ضلعوں کے جدا جدا برابر ہوں۔
 (۳) اگر ایک مثلث کے دو ضلع آپس میں مساوی ہوں تو ان کے
 مقابل کے زاویے بھی مساوی ہونگے اور اس کا عکس۔
 (۴) اگر دو قائم الزاویہ مثلثوں میں ایک کا وتر اور ایک ضلع دوسرے
 کے وتر اور ایک ضلع کے بالترتیب مساوی ہوں تو مثلث ہر طرح سے مساوی
 ہونگے۔

- (۵) ایک دیے ہوئے نقطہ سے ایک خط مستقیم تک چھوٹے سے
 چھوٹا فاصلہ وہ عمود ہوتا ہے جو اس نقطہ سے خط مذکور تک کھینچا جائے۔
 (۶) متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع اور نیز زاویے ایک
 دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں اور وتر ایک دوسرے کی تقصیف کرتے ہیں
 اور ہر وتر متوازی الاضلاع کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔
 (۷) اگر تین (یا تین سے زیادہ) متوازی خط ایسے ہوں کہ ان سے
 ایک قاطع کے مقطوع مساوی ہوں تو کسی دوسرے قاطع کے مقطوع بھی مساوی ہونگے۔

۴۔ رتبے۔

- (۱) مساوی قاعدوں اور مساوی ارتفاعوں والے متوازی الاضلاع
 (یا مثلث) رتبے کے لحاظ سے مساوی ہوتے ہیں۔

(۲) کسی مثلث قائم الزاویہ میں وتر پر کا مربع باقی دو ضلعوں پر کے مربعوں کے مجموعہ کے مساوی ہوتا ہے اور اس کا عکس -

۵۔ جبریہ ضابطے -

$$(۱) \quad k = (a + b + c + \dots) = k + k + k + \dots + k + \dots$$

$$(۲) \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(۳) \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(۴) \quad (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$(۵) \quad (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

۶۔ دائرے -

(۱) دائرہ کے مرکز کو وتر کے وسطی نقطہ سے ملائیوا لاخط مستقیم وتر پر عمود ہوتا ہے اور اس کا عکس -

(۲) دو متقاطع دائروں کے مرکزوں کو ملانے والا خط اُن کے مشترک وتر کا عمودی منصف ہوتا ہے -

(۳) تین دیے ہوئے نقطوں میں سے جو ایک خط مستقیم میں نہیں ہیں ایک اور صرف ایک دائرہ کھینچ سکتا ہے -

(۴) ایک ہی دائرہ میں یا مساوی دائروں میں مساوی قوسوں یا مساوی وتروں کے محاذی محیط (یا مرکز) پر مساوی زاویے بنتے ہیں اور اس کا عکس -

(۵) کسی دائرہ میں مساوی طول کے وتر مرکز سے مساوی الفصل ہوتے ہیں اور اس کا عکس -

(۶) دائرہ کا کوئی مماس اس کے نقطہ تماس میں سے گزرنے والے نصف قطر پر عمود ہوتا ہے -

(۷) دائرہ کے کسی مماس اور اس کے نقطہ تماس میں سے گزرنے والے

کسی وتر کا درمیانی زاویہ متبادل قطعہ کے اندر کے زاویے کے مساوی ہوتا ہے۔
 (۸) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو مس کریں تو دائروں کے مرکز اور نقطہ تماس ایک خط مستقیم میں ہوتے ہیں۔
 (۹) دائرہ کے اندر اپنے ہوئے ایک ذواربعتہ الاضلاع (چار ضلعی) کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ دو قائلے ہوتا ہے اور اس کا عکس۔
 (۱۰) اگر ایک دائرہ کے دو وتر ایک دوسرے کو قطع کریں تو ایک وتر کے حصوں کا حاصل ضرب دوسرے وتر کے حصوں کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔

۷۔ طریق

(۱) دو ثابت نقطوں سے مساوی افصل نقطوں کا طریق معلومہ نقطوں کو ملانے والے خط کا عمودی منصف ہوتا ہے۔
 (۲) ایک ایسے نقطہ کا طریق جو ایک دیے ہوئے خط سے ایک دیے ہوئے فاصلہ پر ہے متوازی خطوط کا ایک جوڑا ہے جن میں سے ہر ایک دیے ہوئے خط کے متوازی ہے۔
 (۳) ایک ایسے نقطہ کا طریق جو دو متقاطع خطوط مستقیم سے مساوی فاصلوں پر رہتا ہے ان خطوط کے درمیانی زاویوں کے منصفوں کا جوڑا ہے۔
 (۴) ایک ایسے نقطہ کا طریق جس پر دو دیے ہوئے نقطوں کو ملانے والا خط کے محاذی ایک دیا ہوا زاویہ بناتا ہے دائرہ کی ایک قوس ہے۔

۸۔ عملی مسئلے

(۱) ایک دیے ہوئے خط یا زاویہ کی تنصیف کرنا۔
 (۲) ایک دیے ہوئے خط پر ایک نقطے سے (جو دیے ہوئے خط پر یا اس کے باہر ہو) عمود کھینچنا۔
 (۳) دیے ہوئے زاویہ کے مساوی زاویہ بنانا۔

(۴) ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے ایک دیے ہوئے خط کے متوازی خط

کھینچنا۔

(۵) ایک دیے ہوئے خط کو متعدد مساوی حصوں میں تقسیم کرنا۔

(۶) مثلث کا بنانا جبکہ

(۱) تین ضلعے معلوم ہوں۔

(ب) دو ضلعے اور درمیانی زاویہ معلوم ہوں۔

(ج) ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں۔

(۷) ایک دیے ہوئے کثیر الاضلاع کے مساوی رقبہ کا مربع بنانا۔

(۸) ایک دیے ہوئے صحیح عدد کا جذر ہندسی طور پر معلوم کرنا۔

(۹) ایک دائرہ کھینچنا جو

(۱) ایک مثلث کے راسوں میں سے گزرے۔

(ب) ایک مثلث کے ضلعوں کو مس کرے۔

(۱۰) ایک دیے ہوئے نقطہ پر دائرہ کا مماس کھینچنا۔

(۱۱) ایک بیرونی نقطہ سے دائرہ کے دو مماس کھینچنا۔

(۱۲) دو دیے ہوئے دائروں کے مشترک (راست اور متقاطع)

مماس کھینچنا۔

دوسرا باب

نسبت و تناسب

۹۔ تعریفات اور ابتدائی اصول۔

ایک مقدار کو اسی جنس کی کسی دوسری مقدار کے ساتھ جو ربط یا رشتہ ہو اس کو ان مقداروں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ یہ رشتہ ان مقداروں کا اس طرح مقابلہ کرنے سے دیکھا جائے کہ ایک مقدار دوسری مقدار کا کتنے گنا یا کونسا حصہ ہے۔ مثلاً اگر دو ہم جنس مقداروں میں بالترتیب ۱ اور ۲ اکائیوں ہوں تو پہلی مقدار کو دوسری مقدار کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کسر $\frac{1}{2}$ یا علامت $1:2$ سے تعبیر ہوتی ہے۔ پہلی مقدار ۱ کو نسبت کا مقدم اور دوسری مقدار ۲ کو مؤخر کہتے ہیں۔

دو مقداروں کی نسبت اس اکائی پر موقوف نہیں ہوتی جس کی رقم میں ان مقداروں کو ناپا گیا ہے۔

یہ نہایت ضروری ہے کہ جن مقداروں کا مقابلہ ایک نسبت کے ذریعہ کیا جائے وہ ایک ہی جنس کی ہوں۔ مثلاً دونوں طول ہوں یا دونوں اونچائی ہوں یا دونوں رقبے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک خط کے طول کا مقابلہ دوسری جنس کی کسی مقدار مثلاً کسی مثلث کے رقبے کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔

نیز نسبت ایک عدد مجزود ہے جو صحیح یا کمزور ہو سکتا ہے مثلاً ۶ سمر اور ۸ سمر
لمبے خطوط کے طولوں کی نسبت $\frac{۱}{۲}$ یا $\frac{۳}{۴}$ ہے نہ کہ $\frac{۳}{۴}$ سمر۔
اگر دو ہم جنس مقداروں کو ایک مشترک اکائی (جسے وفق مشترک کہتے
ہیں) کی رقوم میں پورا پورا ناپا جاسکے تو ان مقداروں کو متوافق مقداریں کہتے
ہیں اور ان مقداروں کی نسبت کو دو صحیح اعداد کی نسبت سے تعبیر کیا جاسکتا

ہے۔ ممکن ہے کہ دی ہوئی مقداروں میں کوئی وفق مشترک نہ ہو مثلاً اگر ایک
مربع کا ضلع ۱ ہو تو اس کا وتر ۱.۴۱۴ ہوگا۔ ۱.۴۱۴ کی قیمت ٹھیک ٹھیک طور پر نہیں
نکالی جاسکتی اگرچہ یہ قیمت کسی مطلوبہ درجہ صحت تک حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ مربع کے ضلع اور وتر کے طول ایک ہی اکائی کی رقوم میں
ٹھیک ٹھیک طور پر نہیں ناپے جاسکتے۔

ایسی مقداروں کو جن میں کوئی وفق مشترک نہ ہو غیر متوافق یا متباہن
مقداریں کہتے ہیں۔ دو غیر متوافق مقداروں کی نسبت کو ٹھیک ٹھیک طور پر دو صحیح
اعداد کی نسبت کی شکل میں بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی نسبت کو کسی مطلوبہ
درجہ صحت تک معلوم کیا جاسکتا ہے مثلاً اگر ۱.۴۱۴ کی تقریبی قیمت ۱.۴۱۴ والی جاکے
تو مربع کے ضلع اور وتر کی نسبت کی قیمت $\frac{۱۴۱۴}{۱۰۰۰۰}$ سے تعبیر ہوگی جہاں
طول کی ایک چھوٹی اکائی... کو بطور وفق مشترک لیا گیا ہے۔ مربع کے
ضلع اور وتر کے طولوں کی نسبت کی اس سے بہتر تقریبی قیمت معلوم ہو سکتی
ہے اگر ۱.۴۱۴ کی تقریبی قیمت اعشاریہ کے چار سے زیادہ مقاموں تک
لی جائے۔

۱۰۔ اگر دو ہم جنس مقداروں کی نسبت دو سہری ہم جنس مقداروں
کی نسبت کے مساوی ہو تو یہ چار مقداریں متناسب کہلاتی ہیں۔ یا یوں بیان
کرتے ہیں کہ یہ چار مقداریں متناسب میں ہیں مثلاً اگر $a : b = c : d$ تو a, b, c, d
ب، لا، تا متناسب کہلاتی ہیں۔

تعریف۔ ۱ اور ۲ کو طرفین متناسب اور ۳ اور ۴ کو

و سطین تناسب کہتے ہیں۔

نوٹ۔ کسی تناسب مثلاً $a : b = c : d$ میں ہر نسبت کی مقداریں ایک ہی جنس کی ہونی چاہئیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں نسبتوں کی چاروں مقداریں ایک ہی جنس کی ہوں مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ a اور b دونوں رقبے ہوں اور c اور d دونوں طول۔ اس صورت میں تناسب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے رقبہ کو دوسرے رقبہ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پہلے طول کو دوسرے طول کے ساتھ ہے۔

۱۱۔ تعریضات۔ اگر چار مقداریں $a : b :: c : d$ ایسی ہوں کہ

$a : b = c : d$ تو a کو $a : b :: c : d$ کا چوتھا تناسب کہتے ہیں۔
اگر تین مقداریں $a : b :: c : d$ ایسی ہوں کہ $a : b = c : d$ تو c کو a اور b کا تیسرا تناسب کہتے ہیں اور b کو a اور c کا وسط تناسب یا ہندسی اوسط کہتے ہیں۔

۱۲۔ علوم متعارفہ۔

(۱) جو نسبتیں ایک ہی نسبت کے مساوی ہوں وہ ایک دوسرے کے بھی مساوی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر $a : b = c : d$ اور $c : d = e : f$ تو ظاہر ہے کہ $a : b = e : f$ ۔
(۲) اگر تین ہم جنس مقداریں $a : b :: c : d$ ایسی ہوں کہ $a : b = c : d$ تو ظاہر ہے کہ $a = c$ ۔

۱۳۔ تناسب کے ابتدائی مسائل۔

تناسب کے متعلق مندرجہ ذیل ابتدائی مسئلوں کے ثبوت جبر و مقابلہ کی کسی درسی کتاب میں پائے جاسکتے ہیں۔

(۱) اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ تو

(۱) $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ (عکس نسبت)

$$C_2 = 1/2 (3)$$

(۴۴) $\frac{a+b}{c} = \frac{a+c}{c}$ (شریک نبوت)

(5) $\frac{a-b}{c-d} = \frac{a-b}{c-d}$ (تفصیل نسبت)

(۶) $\frac{ا+ب}{ا-ب} = \frac{ج+د}{ج-د}$ (ترکیب تفصیل نسبت)

(ب) اگر $\frac{1}{p} = \frac{ج}{و} = \frac{ع}{ف} = \dots\dots\dots = ک$ تر

$$\frac{\dots + \text{ع} + \text{ج} + \text{ا}}{\dots + \text{ف} + \text{د} + \text{ب}} = \text{ك}$$

$\frac{م ا + م ج + م ع + \dots}{م اب + م و + م ف + \dots} =$ جہاں م، م، م، کوئی عدد ہیں

۱۴۔ تعریف۔ اگر ایک محدود خط مستقیم اب پر (۱ اور ب کے درمیان) ایک نقطہ لایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کی داخلی تقسیم نقطہ لا پر ہوئی ہے۔



۱۲۔ الا اور لا ب خط اب کے دو حصے ہیں اور ان کے طولوں کی علامت ایک ہی ہے کیونکہ دونوں کی سمت وہی ہے اس لیے الا اور لا ب کی نسبت ایک مثبت مقدار ہوگی۔

اگر نقطہ 'ما' اب محدودہ پر (ا کی جانب یا ب کی جانب) لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کی خارجی تقسیم نقطہ 'ما' پر ہوئی ہے اس صورت میں اما اور ما ب کی سمتیں مختلف ہیں اور خط اب کے دو حصے اما 'ما ب' ہیں جو

مختلف علامت ہیں۔ اس لئے اما اور ما ب کی نسبت ایک منفی مقدار ہے۔



پس معلوم ہوا کہ اگر اب کے حصص کی نسبت کی علامت مثبت ہو تو تقسیم داخلی ہوگی اور اگر نسبت مذکور کی علامت منفی ہو تو تقسیم خارجی ہوگی۔

خارجی تقسیم کی صورت میں اگر ما ب کی طرف واقع ہو تو اما اور ما ب کی نسبت ایک منفی مقدار ہوگی جس کی عددی قیمت اسے بڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر ما ب کی طرف واقع ہو تو اما اور ما ب کی نسبت ایک منفی کسر واجب ہوگی۔

نوٹ۔ عام طور پر اگر اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو اختصار اور سہولت کے مد نظر خط کے حصوں کی نسبت کی علامت کو فطری انداز کر دیا جاتا ہے مثلاً اگر اب محدود پر نقطہ ما ایسا ہو کہ اما اور ما ب کی نسبت $\frac{3}{2}$ ہو تو اسے یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اب کی خارجی تقسیم نقطہ ما پر $\frac{2}{3}$ کی نسبت میں ہوئی ہے۔

۱۵۔ مسئلہ۔ ایک دیے ہوئے خط کو ایک دی ہوئی نسبت میں داخل ایک اور صرف

ایک ہی نقطہ پر اور خارجاً ایک اور صرف ایک ہی نقطہ پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔



اگر ممکن ہو تو فرض کرو کہ ایک دیے ہوئے خط اب کو داخل ایک دی ہوئی نسبت ج میں دو مختلف نقطوں لا اور لا پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{از روئے مفروض } \frac{لا}{اب} = \frac{ج}{ب} \quad \text{اور} \quad \frac{لا}{اب} = \frac{ج}{ب}$$

$$\therefore \frac{لا}{اب} = \frac{لا}{اب}$$

$$\therefore \frac{لا + لا}{اب} = \frac{لا + لا}{اب} \quad \text{یعنی} \quad \frac{لا}{اب} = \frac{لا}{اب}$$

∴ لا ب = لا ب
پس لا منطبق ہے لا پر یعنی لا اور لا مختلف نقطے نہیں ہیں۔
اسی طرح خارجی تقسیم کی صورت میں بھی یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا
ثبوت مندرجہ بالا طریقہ سے طالب علم خود بہم پہنچائے۔

مشکل ۱

(۱) ایک خط مستقیم ۶ و ۹ لمبا ہے اس کی داخلی تقسیم ۵ : ۷ کی نسبت
میں کی گئی ہے۔ خط کے حصوں کے طول معلوم کرو۔ (جواب ۴ و ۵)
(۲) ایک خط مستقیم ۵ و ۴ سم لمبا ہے۔ اس کی خارجی تقسیم ۵ : ۴ کی
نسبت میں کی گئی ہے، حصوں کے طول معلوم کرو۔ (جواب ۵ و ۲۲ سم، ۱۸ سم)
(۳) خط مستقیم اب ۴ و ۶ سم لمبا ہے اسکو داخلی لا پر اور خارجی لا پر
ایک ہی نسبت ۵ : ۳ میں تقسیم کیا گیا ہے، لا اور اما کے طول معلوم کرو

اور تصدیق کرو کہ $\frac{۲}{۱۲} = \frac{۱}{۱۸} + \frac{۱}{۱۸}$ [جواب لا = ۴ سم، اما = ۱۶ سم]
(۴) لے خط مستقیم کی داخلی تقسیم نسبت م : ن میں کی گئی ہے، حصوں

کے طول معلوم کرو (جواب $\frac{۱}{م+ن}$ ، $\frac{۱}{ن}$)
(۵) لے خط مستقیم کی خارجی تقسیم نسبت م : ن میں کی گئی ہے،

حصوں کے طول معلوم کرو۔ (جواب $\frac{۱}{م-ن}$ ، $\frac{۱}{ن}$)
(۶) دو خطوط مستقیم اب اور ج د کی داخلی تقسیم ایک ہی نسبت میں
بالترتیب لا اور ما پر کی گئی ہے، ثابت کرو کہ

$$(۱) اب : لا ب = ج د : ماد$$

$$(۲) اب : لا = ج د : ج ما$$

(۷) اب ایک خط مستقیم ہے، ایک نقطہ لا سے ب کی طرف


مسلط طور پر حرکت کرتا ہے، نسبت $الا:لاب$ کی قیمت کے تغیر پر بحث کرو۔
فرض کرو کہ $اب$ کا وسطی نقطہ $و$ ہے اگر نقطہ $لا$ ، نقطہ $ا$ پر ہو تو نسبت $الا:لاب =$



اگر نقطہ $لا$ ، $ا$ اور $و$ کے درمیان ہو تو نسبت $الا:لاب$ ایک مثبت کسر واجب ہوگی۔ جوں جوں نقطہ $لا$ ، $و$ کے قریب آتا جاتا ہے یہ نسبت جو اسے کم ہے بتدریج ا کے قریب آتی جاتی ہے اور جب $لا$ ، $و$ پر منطبق ہوتا ہے تو نسبت $الا:لاب = ۱$

اگر $لا$ ، $و$ اور $ب$ کے درمیان ہو تو نسبت $الا:لاب$ بڑی ہے اسے، جوں جوں $لا$ ، $ب$ کی طرف جاتا ہے نسبت $الا:لاب$ کی قیمت بتدریج بڑھتی جاتی ہے، جب $لا$ ، $ب$ کے نہایت قریب جاتا ہے تو اس نسبت کی قیمت بہت بڑی ہو جاتی ہے اور جب $لا$ ، $ب$ پر منطبق ہو جاتا ہے تو $لاب$ کا طول صفر ہو جاتا ہے اور نسبت $الا:لاب =$ صفر۔ اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ اس نسبت کی قیمت لامتناہی ہے اور اسے علامت ∞ سے تعبیر کرتے ہیں۔ طالب علم کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ جن معنوں میں عام اعداد وجود رکھتے ہیں ان معنوں میں ∞ کوئی عدد نہیں ہے مندرجہ بالا الفاظ کا مفہوم صرف یہ ہے کہ $لا$ کو $ب$ کے کافی قریب لےنے سے $الا:لاب$ کی قیمت کو کسی دیے ہوئے عدد سے (خواہ وہ عدد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو) بڑا بنایا جاسکتا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ جب $لا$ ، $ا$ سے $ب$ تک مسلسل طور پر حرکت کرتا ہے تو نسبت $الا:لاب$ کی قیمت مسلسل طور پر صفر سے ∞ تک بدلتی ہے۔
(۸) $اب$ ایک خط مستقیم ہے۔ ایک نقطہ $لا$ ، $ب$ سے روانہ ہو کر دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ (دیکھو نیچے کی شکل) نسبت $الا:لاب$ کے تغیر پر بحث کرو۔




ظاہر ہے کہ یہ نسبت منفی ہوگی۔

جب لا ب کے قریب ہے تو لا: لا ب بہت بڑی منفی مقدار ہے اور لا کو ب کے کافی قریب لینے سے اس نسبت کی عددی قیمت کو جتنا بڑا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ جوں جوں لا دائیں جانب حرکت کرتا ہے اس نسبت کی عددی قیمت گھٹتی جاتی ہے لیکن ہمیشہ اسے بڑی رہتی ہے۔ لا کو ب سے کافی دُور لینے سے اس نسبت کی عددی قیمت کو ا کے بقدر قریب چاہیں لاسکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جوں جوں لا ب سے شروع ہو کر دائیں طرف حرکت کرتا ہے نسبت لا: لا ب کی عددی قیمت ∞ سے ا کے قریب آتی جاتی ہے۔

نوٹ۔ دیکھا جائے کہ نسبت لا: لا ب کی کسی عددی قیمت کے جواب میں جو ا سے بڑی ہے نقطہ لا کے دو مقام ہیں جن میں ایک و اور ب کے درمیان ہے اور دوسرا اب ممدودہ پر ب کے دائیں جانب ہے۔

(۹) سوال ۷ کے مماثل طریقہ سے نسبت لا: لا ب کے تغیر پر بحث کرو جبکہ لا ب ممدودہ پر ا سے شروع ہو کر دائیں جانب حرکت کرے۔

۱۶۔ مسئلہ: ایک خط مستقیم جو ایک مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہے مثلث کے باقی دو اضلاع کو یا اضلاع ممدودہ کو ایک ہی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔



مثلاً اب ج کے ضلع ب ج کے متوازی ایک خط کھینچا گیا ہے جو اضلاع اب، اج کو یا اضلاع مدودہ کو بالترتیب لا اور ما پر کاٹتا ہے، ثابت کرنا ہے کہ الا : لا ب = اما : ما ج۔
 شکل ۱ میں نقاط لا اور ما بالترتیب اب، اج کی داخلی تقسیم کرتے ہیں۔

اشکال ۱ اور ۲ میں نقاط لا اور ما بالترتیب اب اور اج کی خارجی تقسیم کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ الا اور لا ب کے طولوں کا وفق مشترک طول ط ہے نیز فرض کرو کہ الا میں طول ط م دفعہ شریک ہے اور لا ب میں طول ط ن دفعہ شریک ہے۔

$$\text{تب الا} = \text{م} \times \text{ط اور لا ب} = \text{ن} \times \text{ط}$$

$$\therefore \text{الا : لا ب} = \text{م} \times \text{ط} : \text{ن} \times \text{ط} = \text{م} : \text{ن} \dots\dots (۱)$$

الا اور لا ب کو طول ط والے حصوں میں تقسیم کرو اور نقاط تقسیم میں سے ب ج کے متوازی خطوط کھینچو۔ ان خطوط کے ذریعہ اما اور ما ج بالترتیب مساوی طول والے م اور ن حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فرض کرو کہ ان حصوں میں سے ہر ایک کا طول = ل


$$\text{تب اما} = \text{م} \times \text{ل اور ما ج} = \text{ن} \times \text{ل}$$

$$\therefore \text{اما : ما ج} = \text{م} \times \text{ل} : \text{ن} \times \text{ل} = \text{م} : \text{ن} \dots\dots (۲)$$

پس (۱) اور (۲) سے الا : لا ب = اما : ما ج یہی ثابت کرنا تھا۔
 نوٹ۔ شکل ۱ میں الا : لا ب اور نیز اما : ما ج دونوں مثبت ہیں اور مقدار میں مساوی ہیں۔

اشکال (۲) اور (۳) میں الا : لا ب اور نیز اما : ما ج دونوں منفی ہیں اور مقدار میں مساوی ہیں۔

مسئلہ بالا کا عکس یہ ہے:۔ اگر مثلث اب ج کے اضلاع اب ا ج پر بالترتیب
نقاط لا اور ما اس طرح لیے جائیں کہ (بلحاظ مقدار اور علامت کے)
الا: لاب = اما: ماج تو لا ما متوازی ہو گا اب ج کے



اگر لا ما متوازی نہیں ہے ب ج کے تو لا ما متوازی ب ج کے کہیں گے۔

فرض کرو کہ لا ما اضلاع ا ج سے ما پر ملتا ہے۔

چونکہ لا ما ب ج اس لیے الا: لاب = اما: ماج

لیکن دیا گیا ہے کہ الا: لاب = اما: ماج

اس لیے اما: ماج = اما: ماج

اس لیے نقطہ ما، منطبق ہے نقطہ ما پر

پس ثابت ہوا کہ لا ما متوازی ہے ب ج کے

نوٹ: مسئلہ بالا کے ثبوت میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ الا اور لاب متوافق

مقداریں ہیں۔ اگر الا اور لاب غیر متوافق ہوں تو کسی بہت چھوٹی اکائی کی رقم میں


ان دونوں طولوں کو ناپنے سے الا: لاب کی تقریبی قیمت حاصل کی جاسکتی ہے اور ثابت

کیا جاسکتا ہے کہ اما: ماج کی تقریبی قیمت الا: لاب کی تقریبی قیمت کے مساوی ہے۔

یقینی صریح: اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط کو دو خطوط مستقیم قطع

کریں تو ایک قاطع پر کے مقطوعوں کے طول دوسرے قاطع پر کے متناظر مقطوعوں کے

طولوں کے تناسب ہونگے۔
۱۱۔ مسئلہ عملی۔ ایک دیے ہوئے خط کو داخلہ اور خارجہ ایک ہی ہوئی نسبت میں تقسیم کرنا
 داخلی تقسیم۔ [دیکھو شکل ۱۔]




شکل ۱۔

فرض کرو کہ اب ایک دیا ہوا خط مستقیم ہے۔ اسے داخلہ نسبت م:ن میں تقسیم کرنا مقصود ہے۔ اسے کوئی اور خط اے جھینچو اور طول کی کوئی مناسب اکائی لے کر اے پر نقاط ج اور د ایسے معلوم کرو کہ ا ج ہیں ایسی م اکائیاں اور ج د میں ایسی ن اکائیاں شامل ہوں۔

د ب کو ملاؤ اور د ب کے متوازی ج لا کھینچو جو اب سے لا پر ملے تب نقطہ لا خط اب کو داخلہ دی ہوئی نسبت م:ن میں تقسیم کریگا۔ چونکہ ج لا متوازی ہے مثلث اب د کے ضلع د ب کے

اس لیے ا لا: اب = ا ج: ج د = م:ن
 خارجی تقسیم [دیکھو شکل ۲۔]




شکل ۲۔

اس میں سے کوئی اور خط اے کھینچو اور طول کی کوئی مناسب کافی لمبے کراے پر
نقاط ج اور د ایسے معلوم کرو کہ اے ج میں ایسی م اکائیاں اور ج د میں ایسی ن
اکائیاں شامل ہوں (خارجی تقسیم کی صورت میں اے ج اور ج د کی سمتیں مخالف ہوں گی)۔
د ب کو ملاؤ اور د ب کے امتوازی ج ک کھینچو جو اب محدودہ سے لاپرے
تب نقطہ لا خط اب کو خارج جادی ہوئی نسبت م : ن میں تقسیم کر گیا۔
چونکہ ج ک امتوازی ہے مثلث اب د کے ضلع د ب کے

اس لیے ا ک ا : ب = ا ج : ج د = م : ن
پس اب کی داخلی تقسیم لا پر اور خارجی تقسیم ک پر دی ہوئی نسبت م : ن میں ہوتی
نوٹ۔ مان لیا گیا ہے کہ دی ہوئی نسبت دو صحیح عددوں کی نسبت سے تعبیر کی جا سکتی ہے

۱۸۔ مسئلہ عملی۔ تین دیے ہوئے خطوط ا ب ج کا چوتھا متناسب معلوم کرنا۔

کوئی دو متقاطع خط دل د ک کھینچو۔ دل پر نقاط گ اور ع



ایسے معلوم کرو کہ د گ = ا اور گ ع = ب اور د ک پر نقطہ ہ ایسا معلوم کرو کہ
د ہ = ج


ک ہ کو ملاؤ اور گ ہ کے متوازی ع ف کھینچو جو د ک سے ف پر ملے۔
تب ہ ف چوتھا متناسب ہوگا معلومہ خطوط ا، ب، ج کا
چونکہ مثلث د ع ف میں گ ہ // ع ف
اس لیے د گ : گ ع = د ہ : ہ ف

یعنی $ا : ب = ج : ح$ ف

پس ثابت ہوا کہ $ح$ ف چوتھا تناسب ہے $ا$ ب ج کا
 نوٹ : تیسرے تناسب کی تعریف سے ظاہر ہے کہ $ا$ اور $ب$ کا تیسرا
 تناسب فی الحقیقت $ا$ ب $ب$ کا چوتھا تناسب ہے۔

اس لیے مندرجہ بالا مسئلہ عملی کے طریقہ سے دو دیے ہوئے خطوط مستقیم
 $ا$ اور $ب$ کا تیسرا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۹۔ مسئلہ عملی - دو دیے ہوئے خطوط $ا$ اور $ب$ کے درمیان
 وسط تناسب معلوم کرنا۔



ایک خط مستقیم پر تین نقطے $د$ ، $ع$ ، $ف$ ایسے معلوم کرو کہ

$$د = ع = ا \text{ اور } ع = ف = ب$$

$د$ ف کو قطر مان کر دائرہ کھینچو اور $ع$ میں سے ایک خط $ق$ $ع$ $ق$ کھینچو
 جو $د$ ف پر عمود ہے اور دائرہ سے $ق$ اور $ق$ پر ملتا ہے۔

تب $ع$ $ق$ وسط تناسب ہوگا دیے ہوئے خطوط $ا$ اور $ب$ کے درمیان۔
 چونکہ قطر $د$ ف عمود ہے وتر $ق$ $ق$ پر
 اس لیے $ع$ $ق$ $ع$ $ق$


نیز ق ق اور د ف کے حصوں کے حاصل ضرب مساوی ہیں

$$\text{یعنی } ق ق \times ع د = ع ق \times ع ف$$

$$\text{یعنی } ع ق^2 = ۱ \times ب \quad \text{یعنی } ۱ : ع ق = ع ق : ب$$

پس معلوم ہوا کہ ع ق وسط تناسب ہے ۱ اور ب کے درمیان۔

نوٹ : مندرجہ بالا عمل کے متبادل ثبوت کے لیے دیکھو مسئلہ ۳۱ مثال ۱۰۔
۲۰۔ مسئلہ۔ مثلث کے کسی زاویہ کا داخلی (خارجی) ناصف متقابل کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں داخل (خارجاً) تقسیم کرتا ہے۔
حصہ اول (داخلی ناصف) (دیکھو شکل ۱۔)



مثلث ا ب ج کے زاویہ ب ا ج کا داخلی ناصف متقابل کے ضلع ب ج سے نقطہ لا پر ملتا ہے ثابت کرنا ہے کہ
ب لا : لا ج = ا ب : ا ج

۱۲ کے متوازی ج ع کھینچو جو ب ا محدودہ سے ع پر ملے
تب ب ا آ لا = ا ع ج (متناظر زاویے)
اور لا آ ج = ا ج ع (متبادل زاویے)
لیکن حسب مفروض ب ا آ لا = لا آ ج
اس لیے ا ع ج = ا ج ع

۱۳ آ ج = ا ع (۱)
چونکہ مثلث ب ج ع میں لا ا متوازی ہے ضلع ج ع کے
اس لیے ب ا : لا ج = ب ا : ا ع

= ب ا : ا ج بموجب (۱) - یہی ثابت کرنا تھا۔
مندرجہ بالا مسئلہ کا عکس — اگر مثلث ا ب ج میں ضلع ب ج کی
داخلی تقسیم نقطہ لا پر اس طرح کی جائے کہ ب ا : لا ج = ا ب : ا ج تو لا
داخلی ناصف ہوگا ب آ ج کا

۱۴ کے متوازی ج ع کھینچو جو ب ا محدودہ سے ع پر ملے
چونکہ مثلث ب ج ع میں لا ا متوازی ہے ضلع ج ع کے
اس لیے ب ا : لا ج = ب ا : ا ع
لیکن حسب مفروض ب ا : لا ج = ا ب : ا ج
اس لیے ب ا : ا ع = ا ب : ا ج یعنی ا ع = ا ج

اس لیے ا ج ع = ا ع ج


نیز ب ا آ لا = ا ع ج (متناظر زاویے)

اور لا آ ج = ا ج ع (متبادل زاویے)

اس لیے ب ا آ لا = لا آ ج

یعنی لا ا داخلی ناصف ہے ب آ ج کا - یہی ثابت کرنا تھا۔

حصہ دوم (خارجی ناصف) (دیکھو شکل ۱۱)



شکل ۱۱

مثلث ا ب ج کے زاویہ ب ا ج کا خارجی ناصف مقابل کے ضلع ب ج سے

لا پر ملتا ہے ثابت کرنا ہے کہ $ب ا : ج ا = ج ا : ج ب$
 لا کے متوازی ج ع کھینچو جو ا ب سے ع پر ملے۔
 ب ا کو کسی نقطہ ف تک خارج کرو۔

(مناظر زاویے)

(متبادل زاویے)

$$\angle ف ا ج = \angle ا ج ب$$

$$\angle ج ا ج = \angle ا ج ع$$

$$\text{لیکن حسب مفروض } \angle ف ا ج = \angle ج ا ج$$

$$\text{اس لیے } \angle ا ج ج = \angle ا ج ع$$

$$\text{اس لیے } ا ج = ا ج \dots (۱)$$

چونکہ مثلث ب ج ع میں ج ا متوازی ہے ج ع کے

$$\text{اس لیے } ب ا : ج ا = ج ا : ج ب$$

$$= ا ب : ا ج \text{ بموجب (۱)}$$

یہی ثابت کرتا تھا۔

مندرجہ بالا مسئلہ کا عکس۔ اگر مثلث اب ج میں ضلع ب ج کی خارجی تقسیم نقطہ لا پر اس طرح کی جائے کہ ب لا : ج لا = اب : اج تو لا خارجی ناصف ہوگا ب آج کا

لا کے متوازی ج ع کھینچو جو ب سے ع پر ملے

ب آ کو کسی نقطہ ف تک خارج کرو۔

چونکہ مثلث ب ج ع میں لا، ا متوازی ہے ج ع کے

اس لیے ب لا : ج لا = ب ا : ا ع

لیکن حسب مفروض ب لا : ج لا = اب : اج

اس لیے ب ا : ا ع = اب : اج یعنی ا ع = اج

اس لیے ا ج ع = ا ج ع

(متناظر زاویے)

نیز ف آ لا = ا ع ج

(مبادل زاویے)

اور لا آ ج = ا ج ع

اس لیے ف آ لا = لا آ ج

یعنی آ لا خارجی ناصف ہے ب آ ج کا۔ یہی ثابت کرنا تھا۔

نوٹ : اگر مثلث اب ج میں اب = اج تو ب آ ج کا داخلی ناصف

مقابل کے ضلع ب ج کے وسطی نقطہ میں سے گزرتا ہے۔ یعنی قاعدہ کو اضلاع کی نسبت

یعنی ا : ا کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے جو مسئلہ بالا کے عین مطابق ہے۔

نیز ب آ ج کا خارجی ناصف قاعدہ ب ج کے متوازی ہے اور

اس لیے قاعدہ سے لاتنا ہی پر ملتا ہے۔ یعنی قاعدہ کی خارجی تقسیم ا کی

نسبت میں کرتا ہے، یہ بھی مسئلہ بالا کے عین مطابق ہے۔

۲۱۔ تعریف :- اگر ایک خط مستقیم اب کی داخلی تقسیم نقطہ لا

پر اور خارجی تقسیم نقطہ ما پر اس طرح کی جائے کہ لا : اب = اما : ب ما

تو کہا جاتا ہے کہ اب کی موسیقی تقسیم لا اور ما پر کی گئی ہے۔


ما ————— ب ————— لا ————— ا

بلحاظ ا اور ب کے نقاط لا اور ما ایک دوسرے کے موسیقی مزدوج

کہلاتے ہیں۔

نوٹ (۱) دفعہ ۲۰ کے مسئلہ سے ظاہر ہے کہ مثلث کے کسی زاویہ کے داخلی اور خارجی ناصف مقابل کے ضلع کی موسیقی تقسیم کرتے ہیں۔

نوٹ (۲) ایک دیے ہوئے قاعدہ ب ج پر کوئی مثلث ا ب ج ایسا بنایا گیا ہے کہ ا ب : ا ج ایک مستقل مقدار ہے۔ اگر ب ا ج کے داخلی اور خارجی ناصف قاعدہ ب ج سے بالترتیب لا اور ما پر ملیں تو لا اور ما راس ا



کے تمام مقاموں کے لیے ثابت نقطے ہوں گے۔ نیز لا ا ما قائمہ ہے اس لیے دی ہوئی شرائط کے ماتحت راس ا کا طریق ایک دائرہ ہے جس کا قطر لا ما ہے۔

نوٹ (۳) اگر ایک دیے ہوئے خط ب ج کی موسیقی تقسیم لا ما پر کی جائے اور لا ما قطر پر کے دائرہ پر کوئی نقطہ ا ہو تو ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ا ب : ا ج ایک مستقل مقدار ہے (دیکھو دفعہ ۹۳ باب ۷)۔

لا ما کو قطربان کرکھنچے ہوئے دائرہ کو اپولونیئس (Appolonius) کا دائرہ کہتے ہیں اور یہ دائرہ اس نقطہ کا طریق ہے جس کے فاصلے دو ثابت نقطوں سے مستقل نسبت میں رہتے ہیں۔

امثلہ ۲

(۱) ثابت کرو کہ مثلث کے کسی دو ضلعوں کے وسطی نقطوں کو ملانے والا خط

تیسرے ضلع کے متوازی ہے۔

(۲) مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے ایک خط قاعدہ کے متوازی کھینچا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ یہ خط دوسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔
(۳) ثابت کرو کہ منحرف کے غیر متوازی ضلعوں کے وسطی نقطوں کو ملائے والا خط متوازی اضلاع کے متوازی ہوتا ہے۔

(۴) مثلثات ا ب ج، د ب ج مشترک قاعدہ ب ج کے ایک ہی طرف واقع ہیں قاعدہ کے کسی نقطہ ع میں سے ب ا اور ب د کے متوازی خط کھینچے گئے ہیں جو ا ج، د ج سے بالترتیب ف اور گ پر ملتے ہیں، ثابت کرو کہ ف گ متوازی ہے ا د کے۔

(۵) ایک خط مستقیم مثلث ا ب ج کے اضلاع ب ج، ج ا، ا ب (عمودہ بشرط ضرورت) سے بالترتیب د، ع، ف پر ملتا ہے اور ا ب، ا ج کے ساتھ مساوی زاویے بناتا ہے۔ ثابت کرو کہ ب د : ج د = ب ف : ج ع۔

(۶) مثلث ا ب ج میں ا د عمود ہے زاویہ ب کے داخلی ناصف پر۔ ثابت کرو کہ ایک خط جو د میں سے ب ج کے متوازی کھینچا جائے ا ج کی تنصیف کرتا ہے۔

(۷) ا، ب، ج، د چارہم نقطے ہیں (اسی ترتیب میں)۔ اس خط پر ایک نقطہ و ایسا معلوم کرو کہ او : و د = ب و : و ج
(۸) مثلث ا ب ج میں لا ما متوازی ہے ب ج کے اور ا ب، ا ج سے بالترتیب لا اور ما پر ملتا ہے۔

(۱) اگر ا ب = ۶ و ۳، ا ج = ۴ و ۲ اور لا = ۱ و ۲
تو ا ما محسوب کرو [جواب ۴ و ۱]

(ب) اگر ا ب = ۲، ا ج = ۵ و ۱ اور ا ما = ۹ و ۳
تو ب لا محسوب کرو۔ [جواب ۸ و ۵]

(ج) اگر لا : لا ب = ۸ : ۳ اور ا ج = ۸ و ۸ سم
تو ا ما محسوب کرو۔ [جواب ۴ و ۶ سم]

(۹) مثلث ا ب ج میں $\angle = 50^\circ$ ، $\angle = 40^\circ$ اور $\angle = 90^\circ$ ج = ۴، ۳ زاویہ ا کے داخلی اور خارجی منصف ضلع ب ج سے بالترتیب لا اور ما پر ملتے ہیں۔ ب لا اور ب ما کے طول محسوب کرو۔ [جواب ۳، ۴، ۵، ۶]

(۱۰) مثلث ا ب ج کا ایک وسطانیہ ا د ہے، زاویوں ا د ب اور ا د ج کے داخلی ناصف ا ب، ا ج سے بالترتیب لا اور ما پر ملتے ہیں۔ ثابت کرو کہ لا ما متوازی ہے ب ج کے۔

(۱۱) اگر ذواربعتہ الاضلاع ا ب ج د کے زاویوں ا اور ج کے ناصف ب د پر ملیں تو ثابت کرو کہ زاویوں ب اور د کے ناصف ا ج پر ملینگے۔

(۱۲) دفعہ ۲ کے مسئلہ کی مدد سے ثابت کرو کہ (ا) مثلث کے تینوں زاویوں کے داخلی ناصف متراکز ہوتے ہیں۔

(ب) مثلث کے دو زاویوں کے خارجی ناصف اور تیسرے زاویہ کا داخلی ناصف متراکز ہوتے ہیں۔

(۱۳) مثلث کا قاعدہ، رأسی زاویہ اور باقی اضلاع کی نسبت معلوم ہیں، مثلث بناؤ۔


۲۲۔ متشابه اشکال۔

تعریفات۔ اگر دو مستقیم الاضلاع اشکال ایسی ہوں کہ ایک کے زاویے دوسری شکل کے زاویوں کے جدا جدا ایک ہی ترتیب میں مساوی ہوں اور ایک کے ضلع دوسری شکل کے نظیر کے ضلعوں کے متناسب ہوں تو یہ اشکال ایک دوسری کے متشابه کہلاتی ہیں یا مختصراً ان کو متشابه اشکال کہتے ہیں۔

اگر ایک مستقیم الاضلاع شکل کے زاویے جدا جدا ایک ہی ترتیب میں

دوسری مستقیم الاضلاع شکل کے زاویوں کے مساوی ہوں تو یہ اشکال مساوی الزوایا کہلاتی ہیں۔

۲۳۔ مسئلہ - اگر دو مثلث مساوی الزوایا ہوں تو ان کے نظیر کے ضلع متناسب ہوتے ہیں۔



مثلثات اب ج، ا ب ج، میں $\hat{A} = \hat{A'}$ ، $\hat{B} = \hat{B'}$ اور
(لازمًا) $\hat{C} = \hat{C'}$ ثابت کرنا ہے کہ

$$\frac{AB_1}{AB_2} = \frac{BC_1}{BC_2} = \frac{AC_1}{AC_2}$$

ب ا پر نقطہ ا م ایسا لو کہ ب ا م = ب ا اور ب ج، پر
نقطہ ج م ایسا لو کہ ب ج م = ب ج،
ا م ج م کو ملاؤ۔

تب مثلثات ب ا م ج اور ب ا ج، پر سرح سے باہم مساوی ہونگے۔

اس لیے ب ا م ج، = ب ا ج،
اور حسب مفروض ب ا ج، = ب ا م ج،
اس لیے ب ا م ج، = ب ا ج،
اس لیے ا م ج، // ا ج،


$$\text{اس لیے } \frac{BM}{BC} = \frac{AM}{AC}$$

$$(۱) \dots\dots\dots \frac{ب}{ب} = \frac{ج}{ج} \text{ یعنی}$$

$$(۲) \dots\dots\dots \frac{ا}{ا} = \frac{ب}{ب} \text{ اسی طرح سے ثابت ہو سکتا ہے کہ}$$

$$(۱) \text{ اور } (۲) \text{ سے حاصل ہوتا ہے کہ } \frac{ب}{ج} = \frac{ج}{ا} = \frac{ا}{ب} \text{ جو}$$

ثابت کرنا تھا۔
مسئلہ ۲۴۔ اگر ایک مثلث کے تین ضلع دوسرے مثلث کے
 تین ضلعوں کے متناسب ہوں تو متناظر اضلاع کے مقابل کے زاویے مساوی ہونگے۔



$$\text{مثلثات } ا ب ج \text{ اور } ا ب ج \text{ میں } \frac{ب}{ج} = \frac{ج}{ا} = \frac{ا}{ب}$$

ثابت کرنا ہے کہ $\hat{ا} = \hat{ا}$ ، $\hat{ب} = \hat{ب}$ اور (لازمًا) $\hat{ج} = \hat{ج}$
 ب ا پر نقطہ ا، ایسا لو کہ ب ا = ب ا اور ب ج پر نقطہ ج، ایسا لو کہ
 ب ج = ب ج -

ا ج کو ملاؤ۔

$$\text{چونکہ حسب مفروض } \frac{ب}{ج} = \frac{ا}{ب}$$

$$\text{اس لیے } \frac{ب}{ا} = \frac{ا}{ج} \text{ (حسب عمل)}$$

اس لیے $a, b, c // a, b, c$

یعنی مثلثات b, a, c اور b, a, c میں $b, a, c = b, a, c$

اور $b, a, c = b, a, c$

اس لیے یہ مثلثات متساوی الزوایا ہیں۔

$$\text{اس لیے } \frac{b}{a} = \frac{a}{b} = \frac{c}{c}$$

$$\text{یعنی } \frac{b}{a} = \frac{a}{b} = \frac{c}{c}$$

$$\text{لیکن حسب مفروض } \frac{b}{a} = \frac{a}{b} = \frac{c}{c}$$

$$\text{اس لیے } \frac{a}{b} = \frac{b}{a} = \frac{c}{c} \text{ یعنی } a, b, c = a, b, c$$

اس لیے مثلث b, a, c کے ضلع بالترتیب مثلث b, a, c کے ضلعوں کے مساوی ہیں۔

اس لیے یہ مثلثات آپس میں ہر طرح سے مساوی ہیں۔

$$\text{اس لیے } b, a, c = b, a, c = b, a, c$$

$$\text{اور } b, a, c = b, a, c = b, a, c$$

$$\text{اور } b, a, c = b, a, c$$

پس ثابت ہوا کہ مثلثات a, b, c اور a, b, c متساوی الزوایا ہیں۔

۲۵۔ متشابه اشکال پر نوٹ۔ تعریف سے ظاہر ہے کہ متشابه

اشکال کے لیے دو شرائط کا ایک ساتھ پورا ہونا ضروری ہے۔


(۱) ایک شکل کے زاویے ایک ہی ترتیب میں جدا جدا دوسری شکل

کے زاویوں کے مساوی ہوں۔

(۲) ایک شکل کے ضلعے متناسب ہوں دوسری شکل کے نظیر کے ضلعوں کے۔
 دفعات ۲۳ اور ۲۴ سے ظاہر ہے کہ مثلثات کی صورت میں مندرجہ
 بالا شرائط میں سے کسی ایک شرط کے پورا ہونے پر دوسری شرط لازماً خود بخود پوری ہوتی ہے۔
 لیکن تین سے زیادہ ضلعوں والی اشکال کی صورت میں ان کے باہم
 متشابه ہونے کے لیے دونوں شرائط کا ایک ساتھ پورا ہونا ضروری ہے۔
 اس امر کی توضیح اشکال ذیل سے ہوتی ہے۔



شکل ۱



شکل ۲

شکل ۱ میں ایسے دو کثیر الاضلاع دیے گئے ہیں جو شرط (۱) کو پورا
 کرتے ہیں اور شرط (۲) کو پورا نہیں کرتے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ یہ کثیر الاضلاع
 متشابه نہیں ہیں۔
 شکل ۲ میں ایسے دو کثیر الاضلاع دیے گئے ہیں جو شرط (۲) کو پورا
 کرتے ہیں لیکن شرط (۱) کو پورا نہیں کرتے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ یہ کثیر الاضلاع
 بھی متشابه نہیں ہیں۔

اس امر کی ایک اور سادہ مثال ذیل میں درج ہے۔
 ایک مربع اور مستطیل متساوی الزوایا ہیں لیکن ان کے نظیر کے اضلاع
 متناسب نہیں ہیں۔ اس لیے یہ دو اشکال متشابه نہیں ہیں۔ نیز ایک مربع اور مستطیل
 ضلعے متناسب ہیں لیکن اشکال متساوی الزوایا نہیں ہیں اس لیے یہ بھی متشابه نہیں ہیں۔

امثلہ ۳

(۱) مثلث ا ب ج میں لا ما متوازی ہے ب ج کے اور اضلاع ا ب، ا ج سے نقاط لا، ما پر ملتا ہے۔

(ا) اگر ا ب = ۴ و ۲، ب ج = ۶ و ۳، ا ل = ۴ و ۲ تو لا ما معلوم کرو۔
[جواب ا و ۲]

(ب) اگر ب ج = ۷ و ۷، سم لا ما = ۵ و ۵، سم ا ل = ۵ و ۵ سم تو ا ب معلوم کرو۔
[جواب ۹ و ۹ سم]

(۲) مثلث ا ب ج میں ا = ۲، ب = ۵ و ۳، ج = ۵ و ۴ قاعدہ کے سروں میں سے خطوط پ د اور ج ع مقابل کے اضلاع تک کھینچے گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ن پر قطع کرتے ہیں اگر ا ن : ن ج = د ن : ن ب = ۲ : ۵ تو ع د، ا ع اور ج د کے طول معلوم کرو۔
[جواب ۸ و ۸، ۱ و ۱، ۴ و ۴]

(۳) ثابت کرو کہ مثلث کے دو ضلعوں کے وسطی نقطوں کو ملانے والا خط قاعدہ کا نصف ہے۔

(۴) ایک دائرہ کے دو وتر ا ب اور ج د ایک دوسرے کو نقطہ ط پر قطع کرتے ہیں ثابت کرو کہ ا ط x ط ب = ج ط x ط د
(۵) ایک بیرونی نقطہ سے دائرہ کا مماس و ت کھینچا گیا ہے اور وہ میں سے گزرنے والا کوئی قاطع دائرہ کو ا اور ب پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ و ا x و ب = و ت۔

(۶) مثلث ا ب ج کے اندرونی اور خارجی دائروں کے مرکز معمولی ترقیم کے مطابق ہے، ہے، ہے، ہے۔ ثابت کرو کہ

$$(ا) ج ب = ج ا \times ج ب = ا ب$$

$$(ب) ا ب = ا ج \times ا ب = ب ج$$

$$ج ب = ج ا \times ج ب$$

(۷) مثلث ا ب ج کا اندرونی مرکز ہے، ہے، ہے میں سے ایک خط

طبیعی کیا ہے جو سے اپر عمود ہے اور اب' اج سے بالترتیب د' ع پر ملتا ہے
ثابت کرو کہ $د \times ج = ع$ دے

(۸) مثلث اب ج کے رأسوں سے مقابل کے اضلاع پر عمود ا د' ب' ع' ج' ف نکالے گئے ہیں۔ ثابت کرو کہ مثلثات ا ع' ف' ب' د' ف' ج' د' ع میں سے
ہر ایک مثلث اب ج کے متشابه ہے۔ اس کی مدد سے مثلث د ع' ف کے اضلاع
کے طول مثلث اب ج کے اضلاع اور زاویوں کی رقوم میں معلوم کرو۔

[جواب ع' ف = ا ج م ا]

(نوٹ۔ مثلث د ع' ف کو مثلث اب ج کا مثلث پائین کہتے ہیں)۔

(۹) مثلث اب ج بناؤ جس میں ا = ۹۰، ب = ۳، ج = ۴ اور
محیط = ۱۸، اسم اضلاع کے طول معلوم کرو۔ [جواب ا = ۵، ب = ۵، ج = ۴، محیط = ۱۴]
(۱۰) مثلث اب ج میں ا قائمہ ہے اور ا د وتر ب ج پر عمود ہے
ثابت کرو کہ مثلثات اب د' ج ا د' ج ب ا باہم متشابه ہیں اور اس کی مدد سے
ثابت کرو کہ

$$(۱) ا د^2 = ب د \times ج د$$

$$(۲) ا ب^2 = ب د \times ج ب$$

$$(۳) ا ج^2 = ج د \times ج ب$$

$$(۴) ا ب^2 + ا ج^2 = ب ج^2$$

$$(۵) ب د : د ج = ا ب : ا ج$$

(۱۱) مثلث اب ج میں ا د عمود ہے ب ج پر اور ا ع مثلث اب ج
کے حاطہ دائرہ کا قطر ہے ثابت کرو کہ مثلثات ا ج د اور ا ع ب باہم متشابه ہیں
اور اس سے اخذ کرو کہ $ا ب \times ا ج = ا د \times ا ع$


(۱۲) مثلث اب ج کے زاویہ ا کا اندرونی ناصف ضلع ب ج سے لا پر
اور مثلث اب ج کے حاطہ دائرہ سے ما پر ملتا ہے ثابت کرو کہ مثلثات ا ج د اور
ا ماب باہم متشابه ہیں اور اس سے اخذ کرو کہ $ا ب \times ا ج = ا د \times ا م$
(۱۳) ایک شخص جس کا قد ۶ فٹ ہے ایک روشنی کے کھمبے سے ۳۲ فٹ کے

فاصلہ پر کھڑا ہے اور اس کے سایہ کا طول ۸ فٹ ہے۔ بتاؤ کہ روشنی زمین سے کتنی بلندی پر ہے۔ [جواب ۳۱ فٹ]

(۱۴) ایک شخص ایک نہر کی چوڑائی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نہر کے ایک کنارہ پر $\frac{1}{4}$ فٹ اونچی سلاح نصب کی۔ پھر وہ اس کنارہ سے عموداً ۲۰ فٹ پیچھے ہٹا تو سلاح کی چوٹی اور مقابل کا کنارہ ایک سیدھ میں دکھائی دیے۔ اگر اس شخص کی آنکھ کی اونچائی ۵ فٹ ۸ انچ ہو تو نہر کی چوڑائی معلوم کرو۔ [جواب - ۶۰ فٹ]

(۱۵) دو انتصابی کھمبے ۵ فٹ اور ۱۲ فٹ اونچے ہیں۔ ہر ایک کی چوٹی کو دوسرے کھمبے کے قدم سے رسیوں کے ذریعہ ملا یا گیا ہے۔ رسیوں کے نقطہ تقاطع کی بلندی سطح زمین سے معلوم کرو اور ثابت کرو کہ یہ بلندی کھمبوں کے درمیانی فاصلہ پر منحصر نہیں ہے۔ [جواب $\frac{1}{2}$ فٹ]

۲۶۔ مسئلہ۔ اگر دو مثلثوں میں ایک مثلث کا ایک زاویہ دوسرے مثلث کے ایک زاویہ کے مساوی ہو اور ان مساوی زاویوں کے گرد کے اضلاع متناسب ہوں تو مثلثات متشابه ہوں گے۔



مثلثات اب ج اور ا ب ج میں $\hat{A} = \hat{A}$ اور

$$\frac{ا ب}{ا ج} = \frac{ا ج}{ا ج} \text{ ثابت کرنا ہے کہ یہ مثلثات متشابه ہیں۔}$$

ا ب پر نقطہ ہ ایسا لو کہ ا ہ = ا ب اور ا ج پر نقطہ ک ایسا لو کہ

اک = ا ج ا -

ہک کو ملاؤ -

مثلثات اہک، ا ب ج ا میں

$$\hat{ا} = \hat{ا}$$

$$\hat{ا} = \hat{ا}$$

اور اک = ا ج ا

$$: \quad \hat{ا} \hat{ا} = \hat{ا} \hat{ا} = \hat{ا} \hat{ا}$$

$$\text{حسب مفروض} \quad \frac{ا}{ا} = \frac{ا}{ا}$$

$$\text{اس لیے} \quad \frac{ا}{ا} = \frac{ا}{ا} \quad \text{حسب عمل}$$

اس لیے ہک متوازی ہے ب ج کے

$$\text{اس لیے} \quad ا ب ج = ا ہ ک = ا ب ج$$

$$\text{اور} \quad ا ج ب = ا ک ہ = ا ج ب$$

اس لیے مثلثات ا ب ج اور ا ب ج متساوی الزوایا میں لہذا
متشابه ہیں۔ یہی ثابت کرنا تھا۔

مسئلہ ۴

(۱) مثلث ا ب ج میں کوئی خط مستقیم قاعدہ کے متوازی ہے اور
باقی اضلاع سے لگا اور ما پر ملتا ہے۔ ثابت کرو کہ اسے گزرنے والا وسطانیہ
خط لا ما کی تنصیف کرتا ہے۔

(۲) مثلثات ا ب ج اور ا ب ج متشابه ہیں۔ ثابت کرو کہ
ان کے حائل دائروں کے نصف قطروں کی نسبت نظیر کے اضلاع کی نسبت
کے متساوی ہے۔

(۳) ثابت کرو کہ متشابہ مثلثات میں نظیر کے راسوں سے مقابل کے اضلاع پر نکالے ہوئے عمودوں کی نسبت نظیر کے ضلعوں کی نسبت کے مساوی ہے۔
 (۴) ثابت کرو کہ متشابہ مثلثات کے اندرونی دائروں کے نصف قطروں کی نسبت نظیر کے ضلعوں کی نسبت کے مساوی ہے۔

(۵) ثابت کرو کہ مثلث کے ضلعوں کے وسطی نقطوں میں سے گزرنے والے دائرہ کا قطر مثلث کے حائط دائرہ کے نصف قطر کے مساوی ہے۔

(۶) مثلث ABC مساوی الاضلاع ہے۔ ہر ضلع کا طول 1 ہے۔
 ضلع BC کو دونوں جانب خارج کر کے اس پر دو نقطے N اور Q ایسے لیے گئے ہیں کہ $BN = CQ = 1$ اور AN اور AQ کو ملایا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ
 (۱) $NQ : CQ = 1 : 2$
 (۲) $NQ : AN = 3 : 4$



(۷) دو دائرے جن کے نصف قطر 1 اور 2 ہیں ایک دوسرے کو نقطہ A پر خارجاً مس کرتے ہیں۔ اور ان دائروں کا ایک مشترک مماس AN کو Q اور Q پر مس کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ $AN : AQ$ قائمہ ہے اور $QF : QA = 4 : 1$

(۸) دو دائرے ایک دوسرے کو A پر خارجاً مس کرتے ہیں اور ان کا ایک مشترک مماس AF مرکزوں کے خط سے S پر ملتا ہے۔
 ثابت کرو کہ (۱) مثلثات SFA اور SQA متشابہ ہیں۔
 (۲) $SA : SF = SA : SQ$

(۹) مثلثات ABC اور ABJ میں $\frac{AB}{AJ} = \frac{AC}{AJ}$

اور $\hat{B} = \hat{J}$ ، اگرچہ $\hat{C} \neq \hat{J}$ تو ثابت کرو کہ

$\hat{C} + \hat{J} =$ دو قائمہ زاویے۔



چونکہ $\hat{C} \neq \hat{A}$ اس لیے $\hat{A} \neq \hat{A}$
 اب \hat{A} میں سے ایک خط $\hat{A}C$ ایسا کھینچو کہ $\hat{B} \hat{A}C = \hat{B} \hat{A} \hat{C}$
 فرض کرو کہ $\hat{A}C$ ، $\hat{B} \hat{A}C$ سے جڑ پر ملتا ہے۔

اب مثلثات $\hat{A}B \hat{C}$ اور $\hat{A}B \hat{A}C$ متشابه ہیں۔

$$\text{اس لیے } \frac{\hat{A}B}{\hat{A}B} = \frac{\hat{A}C}{\hat{A}C}$$

$$\text{لیکن دیا گیا ہے کہ } \frac{\hat{A}B}{\hat{A}B} = \frac{\hat{A}C}{\hat{A}C}$$

$$\text{یعنی } \frac{\hat{A}C}{\hat{A}C} = \frac{\hat{A}C}{\hat{A}C} \text{ یعنی } \hat{A}C = \hat{A}C$$

$$\text{اس لیے } \hat{A} \hat{C} \hat{C} = \hat{A} \hat{C} \hat{C}$$

$$\text{اس لیے } \hat{A} \hat{C} \hat{B} + \hat{A} \hat{C} \hat{C} = \hat{A} \hat{C} \hat{B} = \hat{A} \hat{C} \hat{B} \text{ قائمہ زاویہ۔}$$


$$\text{لیکن } \hat{A} \hat{C} \hat{B} = \hat{A} \hat{C} \hat{B}$$

$$\text{اس لیے } \hat{A} \hat{C} \hat{B} + \hat{A} \hat{C} \hat{C} = \hat{A} \hat{C} \hat{B} = \hat{A} \hat{C} \hat{B} \text{ قائمہ زاویہ۔}$$

۲۷۔ بعض ہندسی نتائج کو مثلثی نسبتوں کے استعمال سے

نہایت عمدہ طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) مشقت آب ج میں ادا نمود ہے ب ج پر۔ ادا کے
طول کو ع سے تعبیر کرو




(۲) مثلث ABC کا رقبہ $\Delta = \frac{1}{2} AC$ (دیکھو شکل بالا)

$$= \frac{1}{2} AB \sin C$$

اسی طرح سے $\Delta = \frac{1}{2} BC \sin A = \frac{1}{2} AC \sin B$

پس حاصل ہوا کہ $\Delta = \frac{1}{2} AB \sin C = \frac{1}{2} BC \sin A = \frac{1}{2} AC \sin B$

(۳) مثلث ABC کے حاطہ دائرہ کا مرکز M ہے، نصف قطر CM ج کو



س سے تعبیر کرو۔ فرض کرو کہ B ج کا وسطی نقطہ دے تب CM BC قائم ہے اور $CM = \frac{1}{2} BC$


$$\text{اس لیے } \frac{CM}{BC} = \sin A$$

$$\text{یعنی } \frac{1}{2} = \sin A$$

$$\therefore \frac{AB \sin C}{\Delta} = \frac{BC \sin A}{\Delta} = \frac{AC \sin B}{\Delta} = \frac{1}{\Delta}$$

نوٹ: شکل بالا میں مثلث ABC کے تمام زاویے حاقہ لیے گئے ہیں۔

کسی ایک زاویہ کے منفرج یا قائمہ ہونے کی صورت میں طالب علم خود اس نتیجہ کو حاصل کرے۔
۲۸۔ مسئلہ۔ دو متشابه کثیر الاضلاع متشابه مثلثوں کی ایک ہی تعداد میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔



کثیر الاضلاع ا ب ج د ع اور ا ب ج د ع باہم متشابه ہیں۔ ثابت کرنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی تعداد کے متشابه مثلثوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ا ج ' ا د ' ا ج ' ا د کو ملاؤ۔
 چونکہ کثیر الاضلاع متشابه ہیں

اس لیے $\frac{ا ب}{ا ج} = \frac{ا ب'}{ا ج'}$ اور $\frac{ب ج}{ا ج} = \frac{ب ج'}{ا ج'}$
 اس لیے مثلثات ا ب ج اور ا ب ج متشابه ہیں۔

اس لیے $ا ب ج = ا ب ج'$

اور $\frac{ج ا}{ا ج} = \frac{ج ا'}{ا ج'}$

$\frac{ج د}{ج ا} = \frac{ج د'}{ج ا'}$ (کیونکہ کثیر الاضلاع متشابه ہیں)

نیز چونکہ $\hat{ب} \hat{ج} \hat{د} = \hat{ب} \hat{ج} \hat{د}$

اس لیے $\hat{ا} \hat{ج} \hat{د} = \hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$

اب مثلثات $\hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$ اور $\hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$ میں

$\hat{ا} \hat{ج} \hat{د} = \hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$

اور $\frac{\hat{ا} \hat{ج}}{\hat{ا} \hat{ج}} = \frac{\hat{ج} \hat{د}}{\hat{ج} \hat{د}}$

اس لیے مثلثات $\hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$ اور $\hat{ا} \hat{ج} \hat{د}$ باہم متشابه ہیں۔
اسی طرح سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مثلثات $\hat{ا} \hat{د} \hat{ع}$ اور $\hat{ا} \hat{د} \hat{ع}$

بھی متشابه ہیں۔
پس ثابت ہوا کہ متشابه کثیر الاضلاع $\hat{ا} \hat{ب} \hat{ج} \hat{د} \hat{ع}$ اور $\hat{ا} \hat{ب} \hat{ج} \hat{د} \hat{ع}$ کو
ایک ہی تعداد کے متشابه مثلثوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ (۱)۔ اوپر کی شکل میں کثیر الاضلاع کے ضلعوں کی تعداد پانچ ہے
اُس صورت میں جب کہ کثیر الاضلاع میں ضلعوں کی تعداد پانچ سے زیادہ ہو اسی قسم کے
استدلال سے مسئلہ بالاثبات ہو سکتا ہے۔

نوٹ (۲)۔ اس ثبوت میں ضمنی طور پر یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ



$$\frac{\hat{ب} \hat{ج}}{\hat{ب} \hat{ج}} = \frac{\hat{ا} \hat{ج}}{\hat{ا} \hat{ج}} = \frac{\hat{ا} \hat{د}}{\hat{ا} \hat{د}}$$

نوٹ (۳)۔ متناظر اُسوں $\hat{ا}$ اور $\hat{ا}$ کی بجائے کسی اور دو متناظر اُسوں
خطوط کھینچ کر کثیر الاضلاعوں کو متشابه مثلثوں کی ایک ہی تعداد میں تقسیم کیا جاسکتا
ہے۔

۲۹ مسئلہ۔ دو (غیر مساوی) متشابه کثیر الاضلاعوں کو اس طرح
رکھا جاسکتا ہے کہ اُن کے متناظر اُسوں کو ملائے والے خط ایک ہی نقطہ
میں سے گزریں۔

دو غیر مساوی متشابه کثیر الاضلاع $\hat{ا} \hat{ب} \hat{ج} \hat{د} \hat{ع}$ اور $\hat{ا} \hat{ب} \hat{ج} \hat{د} \hat{ع}$ کو
اس طرح رکھا گیا ہے کہ نظیر کے ضلع $\hat{ا} \hat{ب}$ ، $\hat{ا} \hat{ب}$ ایک دوسرے کے

متوازی ہیں۔ (ظاہر ہے کہ نظیر کے ضلعوں کے دوسرے جوڑے بھی متوازی ہونگے)۔ ثابت کرنا ہے کہ خطوط aa' ، bb' ، cc' ، dd' ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔



فرض کرو کہ aa' ، bb' کا نقطہ تقاطع $ش$ ہے، $ش$ ج اور $ش$ ج کو ملاؤ۔

مشابہت $ش$ ab ، $ش$ $a'b'$ مشابہ ہیں

$$\frac{ش}{ab} = \frac{ش}{a'b'}$$

$$\text{لیکن } \frac{اب}{بب} = \frac{بب}{بج}$$

اب مثلثات ش ب ج اور ش ب ج میں
ش ب ج = ش ب ج (کیونکہ ب ج // ب ج)

$$\text{اور } \frac{ش ب}{ش ب} = \frac{ب ج}{ب ج}$$


اس لیے مثلثات ش ب ج اور ش ب ج متشابه ہیں۔

اس لیے ب ش ج = ب ش ج
اس لیے خطوط ش ج اور ش ج ایک دوسرے پر منطبق ہیں۔
یعنی متناظر اُسوں ج ج کو ملانے والا خط نقطہ ش میں سے گزرتا ہے
اسی طرح سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ خطوط د د اور ع ع بھی نقطہ ش میں
سے گزرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ متناظر اُسوں کو ملانے والے خط ایک ہی
نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔


نوٹ (۱)۔ اگر دو متشابه کثیر الاضلاع اس طرح رکھے جائیں کہ نظیر کے ضلع متوازی ہوں تو
یہ ہم وضع شکلیں کہلاتی ہیں اور ان کے نظیر کے نقطوں کو ملانے والے خطوط کا نقطہ تراکز ش
ان ہم وضع متشابه اشکال کا مشابہت کا مرکز کہلاتا ہے۔

نوٹ (۲)۔ اگر متشابه کثیر الاضلاعوں کو ہم وضع طور پر ایک دوسرے کے اندر
رکھا جائے تو مشابہت کا مرکز دونوں شکلوں کے اندر ہوگا۔

نوٹ (۳)۔ دفعہ ہذا کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے جو شکلیں کھینچی گئی ہیں ان میں نظیر کے
اضلاع اب، اب، اب ایک ہی سمت میں متوازی رکھے گئے ہیں۔ اگر نظیر کے اضلاع اب، اب، اب
کو مخالف سمتوں میں متوازی رکھا جائے تو متعلقہ شکل حسب ذیل ہوگی۔



اس صورت میں نظیر کے راسوں کو ملانے والے خط ایک ہی نقطہ میں سے گزریں گے۔
 ۳۰۔ مسئلہ عملی - ایک دیے ہوئے ضلع پر ایک کثیر ضلعی شکل کھینچنا جو ایک
 دی ہوئی کثیر ضلعی شکل کے متشابه ہو۔



فرض کرو کہ اب ج د ع ایک دی ہوئی شکل ہے اور ل دیے ہوئے ضلع
 کا طول ہے ایک شکل بنانا ہے جو دی ہوئی شکل اب ج د ع کے متشابه ہو اور جس میں
 اب کے نظیر کے ضلع کا طول ل ہو۔ اج ا د کو ملاؤ۔

اب (محدودہ بشرط ضرورت) پر ایک نقطہ ب ایسا لو کہ اب = ل
 ب ج متوازی کھینچو ب ج کے جو ا ج سے ج پر ملے۔

اور ج د متوازی کھینچو ج د کے جو ا د سے د پر ملے۔

اور د ع متوازی کھینچو د ع کے جو ا ع سے ع پر ملے۔

تب اب ج د ع مطلوبہ شکل ہوگی۔

ثبوت متشابه مثلثوں کی مدد سے باسانی دیا جاسکتا ہے مشق کے طور پر
 طالب علم ثبوت خود بہم پہنچائے۔

امثلہ ۵

(۱) ذواربعتہ الاضلاع اب ج د اور اب ج د متشابه ہونگے اگر

$$(۱) \hat{ا} = \hat{ا} \text{ اور } \frac{ا ب}{ا ج} = \frac{ب ج}{ب د} = \frac{ج د}{ج د} = \frac{د ا}{د ا}$$

$$(۲) \hat{ا} = \hat{ا}, \hat{ب} = \hat{ب} \text{ اور } \frac{ا ب}{ا ج} = \frac{ب ج}{ب د} = \frac{ج د}{ج د} = \frac{د ا}{د ا}$$

(۲) ذواربۃ الاضلاع ا ب ج د کے متشابه ایک شکل بناؤ جس کے ہر ضلع کو

اپنے نظیر کے ضلع کے ساتھ نسبت ۳ : ۴ ہو۔

(۳) ایک دیے ہوئے خط ا ب پر ایک نصف دائرہ بناؤ۔ اس نصف

دائرہ کے اندر ایک مربع بناؤ جس کے دو راس قوس پر ہوں اور دو قطر پر۔ اگر ا ب کا

طول ۲ ہو تو مربع کا ضلع معلوم کرو۔ (جواب $\frac{۲}{۵}$)

(۴) ۴ و ۴ نصف قطر کا ایک قطاع دائرہ بناؤ جس کا مرکزی زاویہ ۹۰ ہو۔

اس کے اندر ایک مربع بناؤ اور مربع کے ضلع کا طول ناپو اور حساب لگانے سے اپنے جواب کو

[جواب ۲، ۱ (۶۶-۶۶) ایچ]

جاچھو۔

(۵) ایک منتظم سدس ا ب ج د ع ف بناؤ جس کے ہر ضلع کا طول ۲ و ۲

ہو اور اس کے اندر ایک مربع بناؤ جس کے دو ضلع ا ب، د ع کے متوازی ہوں

اور اس کے راس باقی اضلاع پر ہوں۔

(۶) ایک دیے ہوئے مثلث کے اندر ایک ایسا مثلث بناؤ جو

ایک اور دیے ہوئے مثلث کے متشابه ہو۔

(۷) ایک دیے ہوئے کثیر الاضلاع کے متشابه ایک ایسا کثیر الاضلاع

بناؤ جس کا محیط دیا گیا ہے۔

(۸) کثیر الاضلاع ا ب ج د ع کی سطح میں کوئی نقطہ و ہے۔ و ا و ب

و ج، و د، و ع کو بالترتیب نقاط ا، ب، ج، د، ع پر ایک ہی معلومہ نسبت میں

تقسیم کیا گیا ہے ثابت کرو کہ کثیر الاضلاع ا ب ج د ع دیے ہوئے کثیر الاضلاع

ا ب ج د ع کے متشابه ہے۔

(۹) کثیر الاضلاع ا ب ج د ع کی سطح میں کوئی نقطہ ہے اور و ا و ا


محدودہ پر کوئی نقطہ ا لیا گیا ہے۔ ا ب، ب ج، ج د، د ع بالترتیب ا ب، ب ج، ج د، د ع کے

متوازی کھینچے گئے ہیں جو دب، وج، ود و ع سے بالترتیب ب، ج، د، ع، پر ملتے ہیں۔ ا، ع کو ملایا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ کثیر الاضلاع ا، ب، ج، د، ع کثیر الاضلاع ا، ب، ج، د، ع کے متشابه ہے۔

(۱۰) ثابت کرو کہ مخروط مضلع کی کوئی مستوی تراش جو قاعدہ کے متوازی ہو قاعدہ کے متشابه ہوتی ہے۔

(۱۱) متشابه مشترک الممحیط شکلوں کے حاطد دائروں کے قطر نظیر کے ضلعوں کی نسبت میں ہوتے ہیں۔

۳۱۔ مسئلہ۔ اگر ایک مثلث کا ایک زاویہ دوسرے مثلث کے ایک زاویہ کے مساوی ہو تو ان مثلثوں کے رفیعے مساوی زاویوں کے گرد کے ضلعوں کے حاصل ضربوں کے تناسب ہونگے۔



مثلث ا، ب، ج کا زاویہ ا مثلث د، ع، ف کے زاویہ د کے مساوی ہے۔

$$\frac{\Delta ABC}{\Delta DEF} = \frac{AB \times AC}{DE \times DF}$$


ج سے ا، ب پر عمود ج، ہ اور ف سے د، ع پر عمود ف، ک نکالو
مثلثات ج، ا، ہ، ف، د، ع متشابه ہیں۔

$$\text{اس لیے } \frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$$

$$\Delta \text{ ا ب ج } = \frac{1}{m} \text{ ا ب } \times \text{ ج ہ } \\ \Delta \text{ د ع ف } = \frac{1}{n} \text{ د ع } \times \text{ ف ک } \quad \text{اور}$$

$$\therefore \frac{\Delta \text{ ا ب ج }}{\Delta \text{ د ع ف }} = \frac{\text{ا ب } \times \text{ ج ہ }}{\text{د ع } \times \text{ ف ک }} \quad \left[\text{کیونکہ } \frac{\text{ا ج }}{\text{د ف }} = \frac{\text{ا ج }}{\text{د ف }} \right]$$

نوٹ۔ اس مسئلہ کا متبادل ثبوت دفعہ ۲ مثال ۲ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کرو۔
 نتیجہ صریح۔ اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ دوسرے
 متوازی الاضلاع کے ایک زاویہ کے مساوی ہو تو ان کے رقبے مساوی زاویوں
 کے گرد کے ضلعوں کے حاصل ضربوں کے متناسب ہونگے۔
۳۳ مسئلہ۔ متشابه مثلثوں کے رقبے متناسط اضلاع کے
 مربعوں کے متناسب ہوتے ہیں۔



مثلثات ا ب ج اور ا ب ج متشابه ہیں۔

$$\frac{\text{ا ب ج}}{\text{ا ب ج}} = \frac{\Delta \text{ ا ب ج}}{\Delta \text{ ا ب ج}} \quad \text{ثابت کرنا ہے کہ}$$

چونکہ مثلثات ا ب ج اور ا ب ج متشابه ہیں اس لیے $\angle \text{ا} = \angle \text{ا}$


$$\text{اور } \frac{\text{ا ب ج}}{\text{ا ب ج}} = \frac{\text{ا ب ج}}{\text{ا ب ج}} \dots \dots \dots (۱)$$

$$\frac{اب \times ب ج}{اب \times ب ج} = \frac{\Delta اب ج}{\Delta اب ج}$$

$$= \frac{اب}{اب} \times \frac{ب ج}{ب ج} \text{ بموجب (۱)}$$

$$= \frac{اب^۲}{اب^۲} \text{ جو ثابت کرنا تھا۔}$$

۳۳۔ مسئلہ۔ متشابه کثیرالاضلاعوں کے رقبے متناظر اضلاع کے مربعوں کے تناسب ہوتے ہیں۔



کثیرالاضلاع ا ب ج د ع اور ا ب ج د ع متشابه ہیں

$$\frac{اب^۲}{اب^۲} = \frac{\text{شکل ا ب ج د ع کا رقبہ}}{\text{شکل ا ب ج د ع کا رقبہ}}$$

اج، اد، اور ا ج، ا د کو ملاؤ۔

چونکہ مثلثات ا ب ج اور ا ب ج د ع متشابه ہیں

$$\text{اس لیے } \frac{\Delta اب ج}{\Delta اب ج} = \frac{اب^۲}{اب^۲} \dots (۱)$$

نیز چونکہ مثلثات ا ج د اور ا ج د متشابه ہیں

اس لیے $\frac{\Delta ا ب ج د}{\Delta ا ب ج د} = \frac{ج د}{ج د}$ (۲)

نیز چونکہ مثلثات ادع اور ا د ج متشابه ہیں

اس لیے $\frac{\Delta ا د ج}{\Delta ا د ج} = \frac{د ج}{د ج}$ (۳)

چونکہ کثیر الاضلاع اب ج د ج د ج د ج متشابه ہیں

اس لیے $\frac{ا ب}{ا ب} = \frac{ج د}{ج د} = \frac{د ج}{د ج}$

اس لیے $\frac{ا ب}{ا ب} = \frac{ج د}{ج د} = \frac{د ج}{د ج}$ (۴)

نتائج (۱)، (۲)، (۳)، (۴) کو ملائے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ا ب}{ا ب} = \frac{\Delta ا ب ج}{\Delta ا ب ج} = \frac{\Delta ا ب ج د}{\Delta ا ب ج د} = \frac{\Delta ا د ج}{\Delta ا د ج}$$

$$\frac{\Delta ا ب ج + \Delta ا ب ج د + \Delta ا د ج}{\Delta ا ب ج + \Delta ا ب ج د + \Delta ا د ج} =$$

$$= \frac{\text{شکل اب ج د ع کا رقبہ}}{\text{شکل اب ج د ع کا رقبہ}} \text{ یہی ثابت کرنا تھا۔}$$

مسئلہ ۱

- (۱) مثلث اب ج میں اضلاع اب، ا ج کے وسطی نقطے د اور ع ہیں ثابت کرو کہ $\Delta ا د ج$ کا رقبہ منحرف د ب ج ع کے رقبہ کا $\frac{۱}{۴}$ ہے۔
- (۲) ایک مثلث کے ضلعوں کے وسطی نقطوں کو ملانے سے جو مثلث بنتا ہے اس کا رقبہ دیے ہوئے مثلث کے رقبہ کا کونسا حصہ ہے؟ (جواب $\frac{۱}{۴}$ حصہ)
- (۳) مثلث اب ج میں قاعدہ ب ج کے متوازی خط لا ما اس طرح

کیونکہ ۵ الا ما کا رقبہ منحرف لاج کے رقبہ کا $\frac{9}{4}$ ہے۔

[اشارہ - الا : اب = ۳ : ۴]

(۴) مثلث اب ج میں زاویہ قائمہ ہے اور ا د عمود ہے ب ج پر۔
ثابت کرو کہ Δ ب ا د : Δ ا ج د = اب : اج

(۵) متشابه مشترک الم محیط شکلوں کے رقبے ان کے حاطط دائروں کے قطروں کے مربعوں کے تناسب ہوتے ہیں۔

(۶) ایک دائرہ کے اندر بنے ہوئے منتظم مسدس کا رقبہ اس دائرہ کے گرد بنے ہوئے منتظم مسدس کے رقبہ کا $\frac{1}{2}$ ہے۔

(۷) منحرف اب ج د کے اضلاع اب ج د باہم متوازی ہیں۔ اج اور ب د ایک دوسرے کو پر قطع کرتے ہیں۔ اگر اب : ج د = ۲ : ۳ تو مثلثات و اب اور و ج د کے رقبوں کی نسبت معلوم کرو۔ (جواب $\frac{4}{9}$)

(۸) مثلث اب ج میں $\hat{A} = 90^\circ$ اور ب ع اور ج ف، بالترتیب اضلاع اج، اب پر عمود ہیں۔ ثابت کرو کہ مثلث ا ع ف کا رقبہ مثلث اب ج کے رقبہ کا $\frac{1}{4}$ ہے۔

(۹) ثابت کرو کہ متشابه مثلثوں کے رقبوں میں وہی نسبت ہے جو

(۱) متناظر ارتفاعوں کے مربعوں میں ہے

(۲) متناظر وسطانیوں کے مربعوں میں ہے

(۳) اندرونی دائروں کے قطروں کے مربعوں میں ہے

(۴) حاطط دائروں کے قطروں کے مربعوں میں ہے۔


مسئلہ عملی - ایک کثیر الاضلاع بنانا جو ایک دیے ہوئے

کثیر الاضلاع کے متشابه ہو اور جس کے رقبہ کو دیے ہوئے کثیر الاضلاع کے رقبہ کے ساتھ ایک معلوم نسبت م : ن ہو۔

فرض کرو کہ دیا ہوا کثیر الاضلاع اب ج د ع ہے اب پر نقطہ ف ایسا معلوم کرو کہ

$$\frac{اف}{اب} = \frac{م}{ن}$$

اب کو قطران کر دائرہ کھینچو اور ف سے اب پر عمود ف ق کھینچو جو
دائرہ سے ق پر ملے۔



اب پر نقطہ پ ایسا معلوم کرو کہ اب = اق
اب پر ایک شکل اب ج د ع بناؤ جو دی ہوئی شکل اب ج د ع
کے متشابه ہو۔ تب شکل اب ج د ع مطلوبہ شکل ہوگی۔

$$\text{کیونکہ شکل اب ج د ع کا رقبہ} = \frac{\text{اب}^2}{\text{اب}} = \frac{\text{اق}^2}{\text{اب}} = \frac{\text{اب} \times \text{اف}}{\text{اب}}$$

$$= \frac{\text{اف}}{\text{اب}} = \frac{\text{م}}{\text{ن}}$$

۳۵۔ مسئلہ عملی۔ ایک کثیر الاضلاع بنانا جو ایک دیے ہوئے
کثیر الاضلاع ش کے متشابه ہو اور رقبہ میں ایک اور دیے ہوئے کثیر الاضلاع
ع کے مساوی ہو۔

اشکال ش اور ع کو مربعوں میں تبدیل کرو۔
فرض کرو کہ ان مربعوں کے ضلعوں کے طول بالترتیب ل اور ل
ہیں اگر شکل ش کا ایک ضلع اب ہو تو ایک خط اب ایسا معلوم کرو کہ

$\frac{ا ب}{ا ب} = \frac{ل}{ل}$ اور $ا ب$ پر ایک شکل $ا ب ج د ع$
 بناؤ جو شکل $ش$ کے متشابه ہو اور جن میں $ا ب$ اور $ا ب$ متناظر ضلع ہوں
 تب $ا ب ج د ع$ مطلوبہ شکل ہوگی

کیونکہ $\frac{\text{شکل } ا ب ج د ع}{\text{شکل } ش} = \frac{ا ب}{ا ب} = \frac{ل}{ل} = \frac{\text{شکل } ع}{\text{شکل } ش}$ کا رقبہ
 اس لیے شکل $ا ب ج د ع$ کا رقبہ = شکل $ع$ کا رقبہ

امثلہ

(۱) ایک مساوی الاضلاع مثلث بناؤ جو رقبہ میں ایک دیے ہوئے
 مثلث کے مساوی ہو۔

(۲) ایک مثلث مساوی الاضلاع بناؤ جس کا رقبہ دو دیے ہوئے
 مساوی الاضلاع مثلثوں کے رقبوں کے مجموعہ کے مساوی ہو۔

(۳) ایک مثلث بناؤ جس کے اضلاع ۴ : ۵ : ۷ کے متناسب ہوں
 اور جس کا رقبہ ۵ مربع اینچ ہو۔

(۴) ذواربعتہ الاضلاع $ا ب ج د$ بناؤ جس میں $ا ب = ۴$ سم،
 $ب ج = ۵$ سم، $ج د = ۳$ سم اور $د ا = ۹$ سم اس کے متشابه ایک
 ذواربعتہ الاضلاع بناؤ جس کا رقبہ ۲ ضلع پر کے مساوی الاضلاع مثلث کے
 رقبہ کے مساوی ہو۔


(۵) ایک شکل معین بناؤ جس کا ایک زاویہ ۹۰ کا ہو اور جس کا رقبہ ۲
 ضلع پر بنے ہوئے منتظم مسدس کے رقبہ کے مساوی ہو۔

(۶) ایک متساوی الساقین مثلث بناؤ جس کا اسی زاویہ ۵۰ کا ہو اور
 جس کا رقبہ اس مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو جس کے اضلاع ۲، ۳، ۵ ہیں۔

تیسرا باب

مثبت کے خواص


۳۴۔ تعریف۔ اگر ایک محدود خط AB کے سروں A اور B سے ایک اور خط AC پر عمود AD نکالے جائیں تو محدود خط AB خط AC کا قائم ظل کہلاتا ہے خط AC پر۔



اگر AB اور AC کا درمیانی زاویہ θ ہو تو AD کا طول مساوی ہوگا $AB \times \cos \theta$

۳۵۔ مسئلہ۔ (فیثاغورث کے مسئلہ کی توسیع)

کسی مثلث کے ایک ضلع پر کا مربع بڑا ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے باقی دو ضلعوں کے مربعوں کے مجموعہ سے بموجب اس کے کہ ان ضلعوں کا درمیانی زاویہ منفرجہ ہو، قائمہ ہو یا حادہ ہو اور غیر مساوی ہونے کی صورت میں ان کا فرق دو ضلعوں میں سے ایک ضلع اور اس ضلع پر دوسرے ضلع کے نکل کے حاصل ضرب کا دو چند ہوتا ہے۔



شکل ۱

صورت اول۔ فرض کرو کہ مثلث ABC میں ج منفرجہ ہے۔
اسے بج محدودہ پر عمود ادا نکالو تب ج د نکل ہے ج کا خط بج پر۔
یہ ثابت کرنا ہے کہ $AB^2 = AC^2 + AD^2 + 2 \times AD \times DC$
قائم الزاویہ مثلث ABC میں

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 + (BD \times DC + DC \times BD)$$

$$= AD^2 + BD^2 + 2 \times BD \times DC$$


$$= AD^2 + BD^2 + 2 \times BD \times DC$$

$$= AD^2 + BD^2 + 2 \times BD \times DC$$


[کیونکہ مثلث ABC میں د قائمہ ہے]

صورت دوم۔ فرض کرو کہ مثلث ABC میں ج حادہ ہے۔
اسے بج پر عمود ادا نکالو
تب ج د نکل ہے ج کا خط بج پر

یہ ثابت کرنا ہے کہ $اب^۲ = بجل + ج ا - ۲ ب ج \times د ج -$



شکل ۳



شکل ۴

قائم الزاویہ مثلث اب د میں

$$اب^۲ = اد^۲ + دب^۲ = اد^۲ + (ب ج - ج د)^۲$$

$$= اد^۲ + بجل + ج د^۲ - ۲ ب ج \times د ج$$


$$= بجل + اد^۲ + ج د^۲ - ۲ ب ج \times د ج$$

$$= بجل + ج ا - ۲ ب ج \times د ج$$

[کیونکہ مثلث اج د میں قائمہ ہے]

صورت سوم۔ اگر مثلث اب ج میں ج قائمہ ہو تو

$$اب^۲ = بجل + ج ا$$



شکل ۵

یہ فیثاغورث کا مسئلہ ہے اور طالب علم اس کے ثبوت سے پہلے ہی سے

واقف ہے۔ ان تینوں صورتوں کو ملائے سے مسئلہ دفعہ ہذا ثابت ہوا۔

۳۸۔ دفعہ گزشتہ کی صورت اول میں

$$\text{ج د} = \text{ج ا} \times \text{جم ا ج د} = \text{ج ا} \times \text{جم} \quad (\text{ا ج ب})$$

$$= \text{ج ا} \times \text{جم ج}$$

اس لیے صورت اول کا ضابطہ ا ب ا = ب ج + ج ا + ا ب ج \times ج د ہو جاتا ہے ا ب ا = ب ج + ج ا + ا ب ج \times ج ا \times جم ج (۱)

دفعہ گزشتہ کی صورت دوم میں

$$\text{ج د} = \text{ج ا} \times \text{جم ا ج د}$$

$$= \text{ج ا} \times \text{جم ج}$$

اس لیے صورت دوم کا ضابطہ ا ب ا = ب ج + ج ا + ا ب ج \times ج د ہو جاتا ہے ا ب ا = ب ج + ج ا + ا ب ج \times ج ا \times جم ج (۲)

دفعہ گزشتہ کی صورت سوم میں ج قائمہ ہے اس لیے جم ج = ۰

اس لیے صورت سوم کا ضابطہ ا ب ا = ب ج + ج ا + ا ب ج (۳)


ضابطوں (۱)، (۲)، (۳) کو علم مثلث کی ترقیم کے مطابق

شکل ج = ا + ب ا - ا ب جم ج میں لکھا جاسکتا ہے اور یہ ضابطہ

درست ہے خواہ ج حادہ ہو یا قائمہ یا منفرجہ

۳۹۔ مسئلہ۔ اگر مثلث ا ب ج میں ا د ایک وسطانیہ ہو تو


$$\text{ا ب ا} + \text{ا ج} = \text{ا د} + \text{ا د} + \text{ا ب د}$$



(۷) کسی ذوا ربعة الاضلاع میں وتروں پر کے مربعوں کا مجموعہ متقابل کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے خطوط پر کے مربعوں کے مجموعہ کا دو چندان ہوتا ہے۔

(۸) مثلث ABC کے خطوط وسطی کا نقطہ ترازو ہے، ثابت کرو کہ
 $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 3(AG^2 + BG^2 + CG^2)$

(۹) مثلث ABC میں B پر نقطہ L ایسا ہے کہ $BL = n \cdot AC$ ثابت کرو کہ $m \cdot AB^2 + n \cdot AC^2 = (m+n) \cdot AL^2$
 (اپولونیئس کا مسئلہ)



[اشارہ۔ فرض کرو کہ $AL = n \cdot AC$]

$$AB^2 = AL^2 + BL^2 + 2 \cdot AL \cdot BL \cdot \cos \angle ALB \quad (1)$$

$$AC^2 = AL^2 + LC^2 + 2 \cdot AL \cdot LC \cdot \cos \angle ALB \quad (2)$$

(۱) کو m سے اور (۲) کو n سے ضرب دے کر جمع کرنے سے مطلوبہ نتیجہ

حاصل ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ مسئلہ دفعہ ۳۹ کی عام شکل ہے۔

۴۰۔ مسئلہ۔ (سمسن کا خط) ایک مثلث کے حائط دائرہ پر

کسی نقطہ سے مثلث کے اضلاع پر عمود نکالے جائیں تو عمودوں کے پائین ایک خط مستقیم میں واقع ہوتے ہیں۔


فرض کرو کہ مثلث ABC کے حائط دائرہ پر کوئی نقطہ N ہے

اور N سے مثلث کے اضلاع BC ، CA ، AB پر عمود بالترتیب

N ، D ، E ، F کے نیچے گئے ہیں۔ ثابت کرنا ہے کہ نقاط D ، E ، F

ہم خط ہیں۔

ف ع د کو ملاؤ۔



چونکہ $\angle N = \angle F = \angle A = \angle E = \angle C$ قائمہ
 اس لیے نقاط N, F, A, E, C مشترک المحیط ہیں۔
 اس لیے $\angle N = \angle E = \angle F = \angle A = \angle C$ قائمہ
 (کیونکہ نقاط N, A, B, C مشترک المحیط ہیں)۔
 نیز $\angle N = \angle E = \angle C = \angle D = \angle J = \angle G$ قائمہ زاویہ
 اس لیے نقاط N, E, C, D, J, G مشترک المحیط ہیں۔
 اس لیے $\angle N = \angle E = \angle D$ مکمل ہے $\angle N = \angle J = \angle G$ کا
 یعنی $\angle N = \angle E = \angle D$ مکمل ہے $\angle N = \angle E = \angle F$ کا
 یعنی F, E, D خط مستقیم ہے۔ یہی ثابت کرنا تھا۔
 نوٹ۔ خط F, E, D کو مثلث ABC کے لحاظ سے حاطہ دائرہ پر مرکب
 نقطہ N کا خط پائین یا سمن خط کہتے ہیں۔

مشکل ۹

(۱) (۱) ایک نقطہ سے مثلث ABC کے اضلاع پر عمود نکالیں گے۔

اگر عمودوں کے پائین خط مستقیم میں ہوں تو ثابت کرو کہ ق، مثلث ا ب ج کے حائط دائرہ پر ہے۔
 (ب) اگر نقطہ ق اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ق سے مثلث ا ب ج کے اضلاع پر نکالے ہوئے عمودوں کے پائین خط مستقیم میں واقع ہوتے ہیں تو ق کا طریق معلوم کرو۔
 (۲) مثلث ا ب ج کے حائط دائرہ پر کے کسی نقطہ ن سے ب ج پر عمود ن د نکالا گیا ہے اور یہ حائط دائرہ سے مکرر ن پر ملتا ہے۔ ثابت کرو کہ ن کا خط پائین ان کے متوازی ہے۔

(۳) کسی مثلث کے حائط دائرہ پر کے کسی دو نقطوں ن اور ق کے سمسن خطوں کا درمیانی زاویہ اس زاویہ کے مساوی ہوتا ہے جو ن ق کے محاذی دائرہ پر بنتا ہے۔
 (۴) اگر چار خطوط مستقیم کے نقاط تقاطع سے جن میں سے کوئی دو باہم متوازی نہ ہوں چار مثلث بنائے جائیں تو ثابت کرو کہ ان مثلثوں کے چاروں حائط دائرے ایک مشترک نقطہ میں سے گزرتے ہیں۔

(۵) کسی نقطہ کا سمسن خط نقطہ مذکور کو مثلث کے عمودی مرکز سے ملانے والے خط کی تنصیف کرتا ہے۔


اہم مسئلہ۔ (نو نقطی دائرہ)۔ کسی مثلث میں اضلاع کے وسطی نقطے، رأسوں سے مقابل کے اضلاع پر کے عمودوں کے پائین اور مثلث کے عمودی مرکز کو رأسوں سے ملانے والے خطوں کے وسطی نقطے مشترک محیط ہوتے ہیں۔
 فرض کرو کہ مثلث ا ب ج کے اضلاع ب ج، ج ا، ا ب کے وسطی نقطے بالترتیب د، ع، ف ہیں۔

اور رأسوں ا، ب، ج سے مقابل کے اضلاع پر کے عمودوں کے پائین بالترتیب لا، ما، مے ہیں۔

نیز فرض کرو کہ ان عمودوں کا نقطہ تراکز یعنی مثلث کا عمودی مرکز وہ ہے اور ا، و، ب، ج، و کے وسطی نقطے بالترتیب ع، ہ، جہ ہیں۔
 پہلے ہم ثابت کریں گے کہ ع، ہ، جہ مشترک محیط ہیں د، ع، ف کے ساتھ۔

چونکہ د اور ف بالترتیب وسطی نقطے ہیں ب ج اور ا ب کے

اس لیے د ف // ا ج



نیز چونکہ ع اور ف بالترتیب وسطی نقطے ہیں ا و اور ا ب کے
اس لیے ع ف // ب م
اس لیے د ف اور ع ف کا درمیانی زاویہ مساوی ہے ا ج اور ب م کے
درمیانی زاویہ کے جو کہ قائمہ ہے

د ف ع = قائمہ زاویہ

د ع ع = قائمہ زاویہ

اسی طرح اس لیے نقطہ ع نقاط د، ع، ف کے ساتھ مشترک محیط ہے۔
اسی طرح سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقاط ب، ہ اور جہ بھی مشترک محیط ہیں
د، ع، ف کے ساتھ۔

پس ثابت ہوا کہ ع، ب، جہ مشترک محیط ہیں د، ع، ف کے ساتھ۔
اب ہم ثابت کریں گے کہ نقاط لا، م، اے بھی مشترک محیط ہیں
د، ع، ف کے ساتھ۔

چونکہ ع لا د قائمہ زاویہ ہے اور نیز ع ف د بھی قائمہ ہے۔
اس لیے نقاط ع، ف، لا، د مشترک محیط ہیں۔

یعنی نقطہ لا نقاط ع، ف، د میں سے گزرنے والے دائرہ پر واقع ہے
لیکن نقاط ع، ف، د میں سے گزرنے والا دائرہ نقاط د، ع، ف میں سے
گزرنے والا دائرہ ہے۔

میں معلوم ہوا کہ نقطہ لا نقاط د، ع، ف کے ساتھ مشترک محیط ہے۔
اسی طرح سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقاط ما اور مے بھی نقاط د، ع، ف
کے ساتھ مشترک محیط ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ لا، ما، مے مشترک محیط ہیں د، ع، ف
کے ساتھ۔

پس ثابت ہوا کہ کسی مثلث کے اضلاع کے وسطی نقطے، رأسوں سے مقابل کے
اضلاع پر کے عمودوں کے پائین اور رأسوں کو مثلث کے عمودی مرکز سے
ملانے والے خطوط کے وسطی نقطے مشترک محیط ہوتے ہیں۔

تعریف: کسی مثلث کے مندرجہ بالا نو نقطوں میں سے گزرنے والے
دائرہ کو مثلث کا نو نقطی دائرہ کہتے ہیں اور اس دائرہ کے مرکز کو نو نقطی مرکز کہتے ہیں۔
مسئلہ ۴۲۔ کسی مثلث میں (۱) نو نقطی مرکز، حائط مرکز اور
عمودی مرکز کو ملانے والے خط کا وسطی نقطہ ہوتا ہے۔

اور (۲) نو نقطی دائرہ کا قطر مثلث کے حائط دائرہ کے نصف قطر کے مساوی ہوتا ہے۔
نیز (۳) ہندسی مرکز ہم خط ہوتا ہے حائط مرکز، نو نقطی مرکز اور عمودی مرکز کے ساتھ۔
فرض کرو کہ مثلث ا ب ج کا حائط مرکز س ہے، عمودی مرکز و ہے
اور نو نقطی مرکز ن ہے۔

ثابت کرنا ہے کہ (۱) نقطہ ن خط س و کا نقطہ تنصیف ہے اور
(۲) نو نقطی دائرہ کا قطر حائط دائرہ کے نصف قطر س ا کے مساوی ہے اور نیز (۳)
مثلث کا ہندسی مرکز یعنی مرکز ثقل خط س و پر ہے۔

(۱) دفعہ گزشتہ کی ترقیم کے مطابق چونکہ نو نقطی دائرہ نقاط د اور لا
میں سے گزرتا ہے۔

اس لیے نو نقطی مرکز د لا کے عمودی منصف پر ہوگا۔
اسی طرح سے نو نقطی مرکز ماع کے عمودی منصف پر بھی ہوگا۔

فرض کرو کہ وسطانیہ ا د خط س و سے ٹ پر ملتا ہے
اب متشابہ مثلثات ا ٹ و اور د ٹ س میں

$$\frac{اٹ}{دٹ} = \frac{ا}{دس} = \frac{و}{س} = \frac{۲}{۱}$$

اس لیے وسطانیہ ا د کی داخلی تقسیم نسبت ۲:۱ میں ٹ پر ہوتی ہے۔
اس لیے ٹ مثلث ا ب ج کا ہندی مرکز (مرکز ثقل) ہے۔
پس مسئلہ ثابت ہوا۔

نقشہ ۳۔ مثلاً بالا (۳) میں متشابہ مثلثات ا ٹ و اور د ٹ س سے
حاصل ہوتا ہے کہ

$$\frac{وٹ}{دٹس} = \frac{ا}{دس} = \frac{۲}{۱}$$

یعنی مثلث کا مرکز ثقل ٹ، عمودی مرکز و اور حاط مرکز س کو ملانے والے
خط کی داخلی تقسیم نسبت ۲:۱ میں کرتا ہے۔

مسئلہ ۱

(۱) دفعہ ۴ کے مسئلہ کو استعمال کرنے کے بغیر اسی دفعہ کی ترقیم کے مطابق
ثابت کرو کہ

(۱) لا مشترک محیط ہے ع، ب، ج کے ساتھ

(ب) د مشترک محیط ہے ع، ب، ج کے ساتھ

(ج) ع مشترک محیط ہے لا، ما، مے کے ساتھ

(د) د مشترک محیط ہے لا، ما، مے کے ساتھ

(۲) دفعہ ۴ کی شکل میں ثابت کرو کہ ع ف د جہ مستطیل ہے۔

(۳) دفعہ ۴ کی شکل میں ثابت کرو کہ ع د = ب ع = ج ف

(۴) ثابت کرو کہ ترقیم سابقہ کے مطابق ا د اور ع س ایک دوسرے کی
تصنیف کرتے ہیں۔

(۵) معمولی ترقیم کے مطابق ثابت کرو کہ $۱ + ۲ = ۳$ و حجم ۱
(۶) ایک مثلث کا قاعدہ اور اُسی زاویہ دونوں معلوم ہیں۔ مثلث کے نقطہ

مرکز کا طریق معلوم کرو۔

(۷) مثلث ا ب ج کے جانبی دائروں کے مرکزے $م_1$ ، $م_2$ ، $م_3$ ہیں۔ ثابت کرو کہ
مثلث ا ب ج کا حاطہ دائرہ مثلث $م_1 م_2 م_3$ ہے۔ یہ کا نو نقطہ دائرہ ہے اور اس سے حال
کرو کہ مثلث ا ب ج کا حاطہ دائرہ مثلث $م_1 م_2 م_3$ ہے۔ یہ کے اضلاع کی تنصیف
کرتا ہے۔

(۸) مثلث ا ب ج کا عمودی مرکزہ $م$ ہے ثابت کرو کہ مثلث ا ب ج کا
نو نقطہ دائرہ مثلثات ا ب ب و ج اور ج و ا کا بھی نو نقطہ دائرہ ہے۔
(۹) مثلث کا ایک رُاس اور نو نقطہ دائرہ معلوم ہیں۔ ثابت کرو کہ مثلث
کے عمودی مرکزہ کا طریق ایک دائرہ ہے۔

(۱۰) ایک مثلث کا ایک رُاس عمودی مرکزہ اور نو نقطہ دائرہ کا مرکزہ معلوم
ہیں، مثلث بناؤ۔

(۱۱) ایک مثلث کے دو رُاسی اور نو نقطہ دائرہ کا مرکزہ معلوم ہیں، مثلث بناؤ۔
(۱۲) ایک مثلث کا قاعدہ اور رُاسی زاویہ معلوم ہیں۔ ثابت کرو کہ اس کے
مثلث پائین کا ایک ضلع اور ایک زاویہ مستقل ہیں۔

۴۴ مسئلہ۔ مثلث ا ب ج کے زاویہ ا کا اندرونی منصف
قاعدہ ب ج سے د پر ملے تو

$$ا ب \times ا ج = ا د + ب د + د ج$$

مثلث ا ب ج کا حاطہ دائرہ کھینچو اور فرض کرو کہ ا د محدودہ حاطہ دائرہ
سے ع پر ملتا ہے۔ ج ع کو ملاؤ۔


مثلثات ا ب د اور ا ع ج میں

$$ا ب د = ا ع ج$$

$$ب ا د = ا ع ج$$

∴ مثلثات ا ب د اور ا ع ج متشابه ہیں۔

$$\therefore \frac{ab}{ac} = \frac{ad}{aj}$$



$$\therefore ab \times aj = ac \times ad$$

$$ad = (ad + dj)$$

$$ad^2 = ad \times dj + dj^2$$

$$ad^2 = bd \times dj + dj^2$$

[کیونکہ وتر اع اور بج ایک دوسرے کو د پر قطع کرتے ہیں]۔

پس مسئلہ ثابت ہوا

مشق۔ اگر A کا بیرونی منصف بج محدودہ سے د پر ملے تو

$$ab \times ac = bd \times dj + dj^2 - ad^2$$

حرف مٹا۔ اگر دضہ بالا کی شکل میں اب = اج تو اج = ad × ac۔ اس نتیجہ کا

عکس درست نہیں ہے کیونکہ اگر مثلث متساوی الساقین اب ج کے راس ا میں سے

کوئی خط کھینچا جائے جو قاعدہ یعنی محدود خط بج سے د پر اور حاطط دائرہ سے


ع پر ملے تو

$$aj^2 = ad \times ac$$

۴۴۔ اگر مثلث اب ج کے راس ا سے بج پر عمود اد ہو

اور اے مثلث اب ج کے حاطد دائرہ کا قطر ہو تو اب \times ا ج = Δ \times ا \times ج
ج ع کو ملاؤ

مثلثات اب د اور اے ج میں



ا ب د = ا ع ج (کیونکہ یہ ایک ہی قوس کے اندر کے زاویے ہیں)
اور ا د ب = ا ج ع (کیونکہ ہر ایک قائمہ ہے)
اس لیے مثلثات اب د اور اے ج متشابہ ہیں

$$\text{اس لیے } \frac{ا ب}{ا ع} = \frac{ا د}{ا ج}$$

اس لیے ا ب \times ا ج = ا د \times ا ع - جو ثابت کرنا تھا۔
نوٹ: - اگر عمود ا د کو ع سے تعبیر کیا جائے تو معمولی ترقیم کے مطابق
اس مسئلہ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں: -

$$ب \times ج = ۲ \times ۴ \quad \text{جہاں } ۲ \text{ حاطد دائرہ کا نصف قطر ہے۔}$$

$$\frac{۴ \times ۱}{۲} = \Delta$$

$$\text{اس لیے } ۴ = \frac{\Delta}{۱}$$

۷ کی اس قیمت کو اوپر کے نتیجہ میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\Delta^2}{9} \times ۷۲ = \text{ب ج}$$

$$\frac{\text{ب ج}}{\Delta^4} = \text{یعنی حاطہ دائرہ کا نصف قطر}$$

(مقابلہ کرو دفعہ ۲۷ نتیجہ ۳ سے)

مسئلہ ۱۱

(۱) مثلث ا ب ج کے آ کا داخلی ناصف قاعدہ ب ج سے دیر ملتا ہے۔ ا د کا طول محسوب کرو۔

$$\text{معمولی ترقیم کے مطابق ب د} = \frac{\text{ج ا}}{\text{ب ج}} \text{ اور د ج} = \frac{\text{ب ا}}{\text{ب ج}}$$

$$\text{از روئے دفعہ ۴۲} \text{ ب ج} = \text{ا د} + \text{ب د} \times \text{د ج}$$

$$= \text{ا د} + \frac{\text{ا ب ج}}{\text{ب ج}}$$

$$\text{اس لیے ا د} = \text{ب ج} \left[۱ - \frac{\text{ا ب ج}}{\text{ب ج}} \right] = \text{ب ج} \left[\frac{\text{ب ج} + \text{ج ا} - \text{ا ب ج}}{\text{ب ج}} \right]$$

اگر مثلث کے محیط یعنی ا + ب + ج کو ۲ س سے تعبیر کیا جائے

$$\text{تو ا د} = \frac{\text{ب ج} \times ۲ س (۲ س - \text{ا ب ج})}{\text{ب ج}}$$

$$\therefore \text{ا د} = \frac{۲ س (۲ س - \text{ا ب ج})}{\text{ب ج}}$$

$$= \frac{۲ س (۲ س - \text{ا ب ج})}{\text{ب ج}} = \frac{۱}{۲} \text{ کیونکہ } \frac{۱}{۲} = \frac{۲ س (۲ س - \text{ا ب ج})}{\text{ب ج}}$$

(۲) اگر مثلث اب ج کے زاویہ ا کا خارجی منصف ب ج سے د پر ملے تو

$$\text{ثابت کرو کہ} \quad \frac{2 \text{ ب ج}}{\text{ج ف ب}} = \frac{1}{2} \times \text{ج ب} \quad \frac{1}{2}$$

(۳) مثلث بناؤ جس کا قاعدہ رأسی زاویہ اور باقی دو اضلاع کا حاصل ضرب

معلوم ہیں۔

(۴) مثلث اب ج کے اندرونی دائرہ کا مرکز سے ہے اور ا کے مقابل کے

جانبی دائرہ کا مرکز سے ہے۔ مے ضلع ب ج سے د پر اور حاط دائرہ سے ف پر ملتا ہے۔ ثابت کرو کہ

$$ا د \times ا ف = ا ع \times ا م$$

(۵) ا ب ج میں ا ب = ا ج اور ضلع ب ج پر نقطہ د اس طرح لیا گیا ہے کہ

$$ا ب \times ا ج = ا د + ا ب د \times د ج$$

ثابت کرو کہ ا د زاویہ ب ا ج کا اندرونی ناصف ہے۔

فرض کرو کہ ا د مثلث اب ج کے حاط دائرہ سے ع پر ملتا ہے۔

(دیکھو شکل صفحہ ۴۳)

$$\text{تب} \quad ا د + ا ب د \times د ج = ا د + ا د \times د ع = ا د \times ا ع$$

$$\text{اس لیے} \quad ا ب \times ا ج = ا د \times ا ع$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{ا ب}{ا د} = \frac{ا ع}{ا ج}$$

$$\text{اور} \quad ا ب د = ا ع ج$$

اس لیے امثلہ کے سوال ۹ کی رُو سے

$$\text{یا تو} \quad ا د ب = ا ج ع \dots \dots \dots (۱)$$

$$\text{یا} \quad ا د ب + ا ج ع = ۲ \text{ قائمہ زاویہ} \dots \dots \dots (۲)$$

اب ہم ثابت کرینگے کہ نتیجہ (۲) ناممکن ہے

$$\text{اگر} \quad ا د ب + ا ج ع = ۲ \text{ قائمہ زاویہ}$$

$$\text{تو} \quad ا ج ع = ا د ج \text{ یعنی} \quad ا ج د = ج ع ا = ج ب ا$$

یعنی اب = اج جو شرائط سوال کے خلاف ہے۔

اس لیے ا د ب = ا ج ع

اس لیے ب ا د = ع ا ج یعنی ا د زاویہ ب اج کا اندرونی ناصف ہے۔

(۶) مثلث اب ج میں اب = اج، قاعدہ ب ج یا ب ج محدودہ پر کوئی نقطہ دے، ثابت کرو کہ مثلثات اب د اور اج د کے حاطط دائروں کے نصف قطر مساوی ہیں۔
(۷) سوال ۶ میں اگر اب اور اج مساوی نہ ہوں تو ثابت کرو کہ مثلثات اب د اور اج د کے نصف قطروں کی نسبت اب : اج کے مساوی ہے۔

(۸) ایک ذواربعتہ الاضلاع اب ج د دائرہ کے اندر بنا ہوا ہے۔

دائرہ پر ایک نقطہ ن ایسا معلوم کرو کہ ن ا × ن ج = ن ب × ن د

(اشارہ - ن سے اج پر کا عمود = ن سے ب د پر کا عمود)

(۹) ایک مثلث کا قاعدہ راسی زاویہ دیے گئے ہیں۔ وہ مثلث بناؤ

جس کے اضلاع کا حاصل ضرب بڑے سے بڑا ہے۔

(۱۰) ایک دیے ہوئے دائرہ کے اندر ایک دیے ہوئے رقبہ والا مثلث بنایا

گیا ہے۔ ثابت کرو کہ تینوں ضلعوں کا حاصل ضرب مستقل ہے۔

(۱۱) ایک دائرہ کے وتر اب کا عمودی منصف قوس سے ج پر ملتا ہے اور

قوس اج ب پر کوئی نقطہ دے، ثابت کرو کہ اج ا = اد × دب + د ج

اس کی مدد سے حاصل کرو کہ اد × دب بڑے سے بڑا ہوگا اگر نقطہ د نقطہ ج پر منطبق ہو۔

(۱۲) اب ج د ایک مشترک المحيط ذواربعتہ الاضلاع ہے۔ ثابت کرو کہ

$$\frac{اب \times اد + ج ب \times ج د}{ب ا \times ج د + د ا \times ج ب} = \frac{اج}{ب د}$$

(۱۳) اب ج د ایک مشترک المحيط ذواربعتہ الاضلاع ہے

اس کے حاطط دائرہ پر کے کسی نقطہ ن سے اب، ب ج، ج د، د ا پر عمود


نکالے گئے ہیں جن کے طول بالترتیب ع، ع، ع، ع ہیں اور اسی نقطہ ن سے

وتروں اج، ب د پر کے عمودوں کے طول بالترتیب ع، ع، ع، ع ہیں

ثابت کرو کہ ع ع = ع ع = ع ع

۵۴۔ مسئلہ۔ اگر مثلث اب ج کے رؤسوں 'ا' 'ب' 'ج' میں سے گزرنے والے متراکز خط مقابل کے اضلاع سے بالترتیب نقاط 'د' 'ع' 'ف' پر ملیں تو

$$\frac{ب د}{د ج} \times \frac{ج ع}{ع ا} \times \frac{ا ف}{ف ب} = 1 +$$



فرض کرو کہ 'ا' 'ب' 'ج' کا نقطہ تراکز وہ ہے۔
اگر نقطہ و مثلث کے اندر ہو [دیکھو شکل (۱)] تو تینوں نسبتیں

$$\frac{ب د}{د ج} ، \frac{ج ع}{ع ا} ، \frac{ا ف}{ف ب} \text{ مثبت ہیں۔}$$

اگر نقطہ و مثلث کے باہر ہو [دیکھو اشکال (۲) اور (۳)] تو مندرجہ بالا نسبتوں میں سے صرف ایک مثبت ہوگی اور باقی دو منفی۔

پس ہر صورت میں مندرجہ بالا تینوں نسبتوں کا حاصل ضرب مثبت ہوگا۔

$$\frac{ب د}{د ج} = \frac{ا ب د}{ا د ج} = \frac{ا ب د}{ا د ج} = \frac{ا ب د}{ا د ج} \quad [بموجب دفعہ ۱۳ (ب)]$$


$$\text{اسی طرح سے } \frac{ج ع}{ع ا} = \frac{ا ب ج}{ا ج ا} \text{ اور } \frac{ا ف}{ف ب} = \frac{ا ج و}{ا ج و}$$

$$\text{اس لیے } \frac{\Delta \text{ اوب}}{\Delta \text{ اوج}} \times \frac{\Delta \text{ بوج}}{\Delta \text{ ب و}} \times \frac{\Delta \text{ ج و}}{\Delta \text{ ج وب}} = \frac{\text{اف}}{\text{فب}} \times \frac{\text{ج ع}}{\text{ا ع}} \times \frac{\text{ب د}}{\text{د ج}}$$

اس مسئلہ کا عکس :- اگر مثلث اب ج کے اضلاع ب ج، ج ا، ا ب پر بالترتیب نقاط د، ع، ف اس طرح واقع ہوں کہ

$$1 + = \frac{\text{ب د}}{\text{د ج}} \times \frac{\text{ج ع}}{\text{ا ع}} \times \frac{\text{اف}}{\text{فب}}$$

تو خطوط ا د، ب ع، ج ف متراکز ہونگے۔



فرض کرو کہ ا د اور ب ع کا نقطہ تقاطع د ہے نیز فرض کرو کہ ج و ضلع اب سے ف پر ملتا ہے۔

چونکہ ا د، ب ع، ج ف متراکز خط ہیں

$$\text{اس لیے } \frac{\text{ب د}}{\text{د ج}} \times \frac{\text{ج ع}}{\text{ا ع}} \times \frac{\text{اف}}{\text{فب}} = 1 +$$

لیکن بموجب مفروض $\frac{\text{ب د}}{\text{د ج}} \times \frac{\text{ج ع}}{\text{ا ع}} \times \frac{\text{اف}}{\text{فب}} = 1 +$

اس لیے $\frac{ا ف}{ف ب} = \frac{ا ف}{ف ب}$ (بلحاظ مقدار اور علامت کے)



اس لیے نقطہ و ف نقطہ ف پر منطبق ہے۔
پس ثابت ہوا کہ خطوط د، ب، ع، ج ف متراکز ہیں۔

نوٹ۔ اس سڈ کو کیوا (Ceva) کا سڈ کہتے ہیں۔

۴۔ مسئلہ۔ اگر ایک خط مستقیم اب ج کے اضلاع

بج، ج، ا، اب کو بالترتیب نقاط د، ع، ف پر قطع کرے تو

$$1 - \frac{\text{ب د}}{\text{د ج}} \times \frac{\text{ج ع}}{\text{ع ا}} \times \frac{\text{ا ف}}{\text{ف ب}} = 1$$



تقاطع مثلث کے دو ضلعوں کو داخلہ اور ایک ضلع کو خارجہ قطع کریگا [دیکھو شکل (۱)]
یا تینوں ضلعوں کو خارجہ قطع کریگا [دیکھو شکل (۲)]

اس لیے تین نسبتوں $\frac{ب د}{د ج}$ ، $\frac{ج ع}{ا ع}$ ، $\frac{ا ف}{ف ب}$ میں سے دو مثبت

اور ایک منفی ہوگی یا تینوں منفی ہونگی۔

اس لیے ہر صورت میں ان نسبتوں کا حاصل ضرب منفی ہوگا۔ اب نقاط ا، ب، ج سے قاطع پر بالترتیب عمود ا، ب، م، ج ن نکالو۔ اور فرض کرو کہ ان کے طول بالترتیب h ، h' ، h'' ہیں۔

متشابه مشقات سے بلا لحاظ علامت کے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{ب د}{د ج} = \frac{۱}{۲} = \frac{ج ع}{۱ ع} = \frac{۳}{۴} \text{ اور } \frac{۱}{۲} = \frac{ا ف}{ف ب} = \frac{۳}{۴}$$

اس لیے صرف عددی قیمت کو ملحوظ رکھنے سے

$$۱ = \frac{ب د}{د ج} \times \frac{ج ع}{۱ ع} \times \frac{۱}{۲} = \frac{ا ف}{ف ب} \times \frac{۳}{۴}$$

چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس حاصل ضرب کی علامت مثبتی ہے



$$۱ = \frac{ا ف}{ف ب} \times \frac{ج ع}{۱ ع} \times \frac{۱}{۲}$$

اس مسئلہ کا عکس :- اگر ایک مثلث ا ب ج کے اضلاع

ب ج، ج ا، ا ب پر نقاط د، ع، ف اس طرح واقع ہوں کہ

$$۱ = \frac{ب د}{د ج} \times \frac{ج ع}{۱ ع} \times \frac{ا ف}{ف ب}$$

تو نقاط د، ع، ف ہم خط ہوں گے۔



فرض کرو کہ د ع ضلع ا ب سے ف پر ملتا ہے

چونکہ نقاط د، ع، ف ہم خط ہیں

$$۱ = \frac{ب د}{د ج} \times \frac{ج ع}{۱ ع} \times \frac{ا ف}{ف ب}$$

لیکن بموجب مفروض $\frac{ب د}{د ج} \times \frac{ج ع}{ع ا} \times \frac{ا ف}{ف ب} = ۱ -$

اس لیے $\frac{ا ف}{ف ب} = \frac{ا ف}{ف ب}$ (بلحاظ مقدار اور علامت کے)

اس لیے نقطہ ف نقطہ ف پر منطبق ہے۔

پس ثابت ہوا کہ نقاط د، ع، ف ہم خط ہیں۔


نوٹ :- اس مسئلہ کو مینی لاس (Menelaus) کا مسئلہ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۲

(۱) کیوں کہ مسئلہ کا متبادل ثبوت :-

مثلث ا ب ج کے رأسوں سے متراکز خطوط ا و، ب و، ج و کھینچے گئے

ہیں جو مقابل کے اضلاع سے بالترتیب نقاط د، ع، ف پر ملتے ہیں اور



ایں سے گزرنے والے اور ب ج کے متوازی خط سے ب ع اور ج ف بالترتیب ل اور ط پر ملتے ہیں۔

متشابه مثلثوں کی مدد سے $\frac{ا ف}{ف ب} = \frac{ط ا}{ب ج}$

اور $\frac{ب د}{د ج} = \frac{ب د}{د و} \times \frac{د و}{و ج} = \frac{ا ل}{و ا} \times \frac{ا ل}{ط ا} = \frac{ا ل}{ط ا}$

$$\text{اور } \frac{ج ع}{ا ح} = \frac{ب ج}{ا ل}$$

$$\text{اس لیے } \frac{ا ف}{ب ف} \times \frac{ب د}{ج د} \times \frac{ج ع}{ا ح} = \frac{ط ا}{ب ج} \times \frac{ا ل}{ط ا} \times \frac{ب ج}{ا ل} = 1$$

(۲) کیوا (Ceva) کے مسئلہ کی رو سے ثابت کرو کہ کسی مثلث میں

(۱) خطوط وسطی متراکز ہوتے ہیں۔

(ب) رأسوں سے مقابل کے اضلاع پر کے عمود متراکز ہوتے ہیں۔

(ج) اضلاع کے عمودی منصف متراکز ہوتے ہیں۔

(د) زاویوں کے اندرونی منصف متراکز ہوتے ہیں۔

(ع) دو زاویوں کے خارجی منصف اور تیسرے کا داخلی منصف

متراکز ہوتے ہیں۔

(۳) مثلث ا ب ج کا اندرونی دائرہ مثلث کے اضلاع ب ج، ج ا، ا ب

کو بالترتیب د، ع، ف پر مس کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ ا د، ب ع، ج ف متراکز ہیں۔
اس مسئلہ کا مماثل مسئلہ جانبی دائروں کی صورت میں بھی بیان کرو اور ثابت کرو۔

(۴) ایک مثلث ا ب ج کا اندرونی دائرہ اضلاع ب ج، ج ا، ا ب کو

بالترتیب نقاط د، ع، ف پر مس کرتا ہے۔ ع ف محدودہ ب ج سے ن پر، ف د
محدودہ ج ا سے ق پر اور د ع محدودہ ا ب سے س پر ملے ہیں۔ ثابت کرو کہ
نقاط ن، ق، س ہم خط ہیں۔

(۵) سوال ۴ میں ثابت کرو کہ ب ج کی موسیقی تقسیم د اور ن پر ہوتی ہے۔

(۶) ایک مثلث کے دو زاویوں کے اندرونی منصف اور تیسرے کا خارجی منصف

مقابل کے اضلاع سے ہم خط نقطوں پر ملتے ہیں۔

(۷) ثابت کرو کہ مثلث کے زاویوں کے خارجی ناصف مقابل کے اضلاع سے

جن تین نقطوں پر ملتے ہیں وہ نقطے ہم خط ہیں۔

(۸) مثلث ا ب ج کے رأسوں ا، ب، ج پر حائط دائرہ کے مماس کھینچے

گئے ہیں اور وہ مقابل کے اضلاع سے بالترتیب ل، م، ن پر ملتے ہیں ثابت کرو کہ

نقاط ل، م، ن ہم خط ہیں۔ [اشارہ۔ $\frac{بل}{ج ل} = \frac{ب ب}{ج ج}$]

(۹) مثلث ا ب ج کے اندر ایک نقطہ وہ ہے۔ ثابت کرو کہ زاویوں ا و ب
ب و ج و ا کے خارجی منصف بالترتیب اضلاع ا ب ب ج ج ا سے تین
ہم خط نقطوں پر ملتے ہیں۔

(۱۰) تین متراکز خط 'ا' 'ب' 'ج' و مثلث 'ا' 'ب' 'ج' کے اضلاع 'ب' 'ج' 'ج' 'ا' 'ب' سے بالترتیب 'د' 'ع' 'ف' پر ملتے ہیں اور 'ع' 'ف' 'د' بالترتیب 'ب' 'ج' 'ا' 'ب' سے 'لا' 'ما' 'ے' پر ملتے ہیں۔ ثابت کرو کہ نقاط 'لا' 'ما' 'ے' ہم خط ہیں نیز ثابت کرو کہ 'ب' 'د' 'ج' 'لا' ایک موسیقی صف ہے۔


(۱۱) مثلث ABC کے اندر کوئی نقطہ O ہے۔ ثابت کرو کہ
 $OA + OB + OC < 2AB$ جب $\angle A < 90^\circ$ جب $\angle B < 90^\circ$ جب $\angle C < 90^\circ$ جب $\angle A > 90^\circ$ جب $\angle B > 90^\circ$ جب $\angle C > 90^\circ$
 اس نتیجہ کا عکس بیان کرو اور اس کو بھی ثابت کرو۔



چوتھا باب

دائرہ کے خواص

۴۴۔ مسئلہ۔ مشترک المحيط ذواربعتہ الاضلاع (چار ضلعی) کے وتروں کا حاصل ضرب متقابل کے اضلاع کے حاصل ضربوں کے مجموعہ کے مساوی ہوتا ہے۔



ا ب ج د ایک مشترک المحيط ذواربعتہ الاضلاع ہے، ثابت کرنا ہے کہ

$$ا ج \times ب د = ا ب \times ج د + ا د \times ب ج$$

ج ا د کے مساوی ب ا ع بناؤ۔

فرض کرو کہ ا ع ، ب د سے ع پر ملتا ہے

مثلثات ب ا ع اور ج ا د میں

$$\text{ب ا ع} = \text{ج ا د}$$

$$\text{اور } \text{ا ب ع} = \text{ا ج د}$$

اس لیے مثلثات ب ا ع اور ج ا د متشابه ہیں۔

$$\text{اس لیے } \frac{\text{ا ب}}{\text{ا ج}} = \frac{\text{ب ع}}{\text{ج د}}$$

$$\text{یعنی } \text{ا ب} \times \text{ج د} = \text{ا ج} \times \text{ب ع} \dots\dots\dots (۱)$$

نیز مثلثات ب ا ج اور ع ا د میں

$$\text{ب ا ج} = \text{ع ا د}$$

$$\text{اور } \text{ب ج ا} = \text{ع د ا}$$

اس لیے مثلثات ب ا ج اور ع ا د متشابه ہیں۔

$$\text{اس لیے } \frac{\text{ب ج}}{\text{ع د}} = \frac{\text{ا ج}}{\text{ا د}}$$

$$\text{یعنی } \text{ا د} \times \text{ب ج} = \text{ا ج} \times \text{ع د} \dots\dots\dots (۲)$$

(۱) اور (۲) سے حاصل ہوتا ہے :

$$\text{ا ب} \times \text{ج د} + \text{ا د} \times \text{ب ج} = \text{ا ج} \times \text{ب ع} + \text{ا ج} \times \text{ع د}$$

$$= \text{ا ج} (\text{ب ع} + \text{ع د})$$

$$= \text{ا ج} \times \text{د ب}$$

نوٹ۔ اس مسئلہ کو بطليموس (Ptolemy) کا مسئلہ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳

(۱) مثلث ا ب ج میں ا ب = ا ج ، قاعدہ ب ج کے سروں

ب اور ج سے خطوط ب د اور ج د کھینچے گئے ہیں جو بالترتیب ب ا اور ج ا

پر عمود ہیں۔ ثابت کرو کہ

$$باج \times اد = ا۲ب \times ب۲$$

(۲) مثلث مساوی الاضلاع ابج کے حاطط دائرہ کی قوس صغیر باج پر کوئی نقطہ ن ہے۔ ثابت کرو کہ

$$نبا + نجا = نا$$

(۳) مثلث ابج میں اب = اج، اس مثلث کے حاطط دائرہ کی قوس باج پر کوئی نقطہ ن لیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ (نبا + نجا) : نا ایک مستقل مقدار ہے۔ نیز بتاؤ کہ ن کے کس مقام کے جواب میں نبا + نجا کی قیمت بڑی سے بڑی ہے۔

(۴) مربع ابج د کے حاطط دائرہ کی قوس صغیر اب پر کوئی نقطہ ن لیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ

$$(نا + نجا) : (نبا + ندا) = ن : د$$

(۵) منظم سدس ابج د ع ف کے حاطط دائرہ کی قوس صغیر اب پر کوئی نقطہ ن لیا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ

$$نا + نبا + نجا + نفا = ن + د + ع$$

(۶) بطليموس کے مسئلہ کی مدد سے زاویوں ع اور ہ کی عادیہ قیمتوں کے لیے ثابت کرو کہ

$$جب (ع + ہ) = جب عجم ہ + جم عجب ہ$$


اکافی طول کے خط باد کے قطر پر ایک دائرہ بناؤ۔ باد کی مخالف سمتوں میں زاویہ دبا اور دبا ج بالترتیب ع اور ہ کے مساوی بناؤ (دیکھو شکل صفحہ ۷۹)۔
اج کو ملاؤ۔

بطليموس کے مسئلہ کی رو سے اب \times ج د + اد + باج = اج \times باد

یعنی جم عجب ہ + جب عجم ہ = اج (کیونکہ باد = ا)

لیکن مثلث ابج میں $\frac{اج}{جب (ع + ہ)} =$ مثلث کے حاطط دائرہ کا قطر باد = ا

۷. اج = جب (عہ + بہ)




پس ثابت ہوا کہ جب عہ جم بہ + جم عہ جب بہ = جب (عہ + بہ)
(۷) مندرجہ بالا سوال کے طریقہ سے مناسب شکلیں کھینچ کر ثابت کرو کہ

(ا) جب (عہ - بہ) = جب عہ جم بہ - جم عہ جب بہ

(ب) جم (عہ + بہ) = جم عہ جم بہ - جب عہ جب بہ

(ج) جم (عہ - بہ) = جم عہ جم بہ + جب عہ جب بہ

(۸) اگر دو دائروں میں کوئی دو مستوازی نصف قطر (ہر دائرہ میں ایک) کھینچے جائیں تو ان کے سروں کو ملائے والا خط مستقیم مرکزوں کے خط کو دو ثابت نقطوں میں سے کسی ایک نہ ایک پر قطع کرتا ہے۔



فرض کرو کہ (و) اور (م) دو دیے ہوئے دائرے ہیں۔

جن کے نصف قطر بالترتیب p اور p' ہیں۔ ان میں دو نصف قطر (۱) OP اور OP' ایک ہی سمت میں متوازی اور (۲) OP اور OP' مخالف سمتوں میں متوازی کھینچے گئے ہیں۔

خطوط OP اور OP' مرکزوں کے خط OP کو بالترتیب نقاط S اور S' پر قطع کرتے ہیں۔ ثابت کرنا ہے کہ S اور S' دو ثابت نقطے ہیں۔

حصہ اول - چونکہ $OP \parallel OP'$ اس لیے مثلثات OSP اور $OS'P'$ متشابه ہیں۔

اس لیے $\frac{OS}{OP} = \frac{OS'}{OP'} = \frac{p}{p'}$ جو ایک مستقل مقدار ہے۔

یعنی مرکزوں کے خط OP کی خارجی تقسیم p : p' کی نسبت میں نقطہ S برہوتی ہے اس لیے S ایک ثابت نقطہ ہے۔

حصہ دوم - چونکہ $OP \parallel OP'$ اس لیے مثلثات OSP اور $OS'P'$ متشابه ہیں۔

اس لیے $\frac{OS}{OP} = \frac{OS'}{OP'} = \frac{p}{p'}$ جو ایک مستقل مقدار ہے۔

یعنی مرکزوں کے خط OP کی داخلی تقسیم p : p' کی نسبت میں نقطہ S برہوتی ہے۔ اس لیے S ایک ثابت نقطہ ہے۔ پس مسئلہ ثابت ہوا۔

تعریف - نقاط S اور S' جن پر مرکزوں کے خط OP کی داخلی اور خارجی تقسیم نصف قطروں p اور p' کی نسبت میں ہوتی ہے، ویسے ہوئے دائروں کے مشابہت کے مرکز کہلاتے ہیں۔ S یہ بھی مشابہت کا مرکز ہے اور S' آڑی مشابہت کا مرکز۔

مسئلہ ۱۴

(۱) دائروں (۳) اور (۴) کے نصف قطر d اور d' ہیں اور


۱۱ = ۴ ان دائروں کی مشابہت کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ محسوب کرو۔

[جواب - ۳]

(۲) ثابت کرو کہ دائروں (۱) اور (۲) کے راست مشترک مماسات کا نقطہ تقاطع سیدھی مشابہت کے مرکز نش پر اور متقاطع مشترک مماسات کا نقطہ تقاطع آڑی مشابہت کے مرکز نش پر ہے۔

(۳) ایک متغیر دائرہ (ج) دو دیے ہوئے دائروں (۱) اور (۲) کو نقاط ف اور ق پر مس کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ خط مستقیم ف ق دیے ہوئے دائروں کے ایک نہ ایک مشابہت کے مرکز میں سے گزرتا ہے۔ مختلف صورتوں میں امتیاز کرو۔

(۴) دو دیے ہوئے دائروں (۱) اور (۲) کی سیدھی مشابہت کے مرکز نش میں سے ایک خط کھینچا گیا ہے جو دائرہ (۲) کو نقطہ ن پر اور (۱) پر اور دائرہ (۲) کو نقطہ ن پر قطع کرتا ہے (دیکھو شکل)



ثابت کرو کہ ON متوازی ہے O_1P اور O_1Q متوازی ہے O_2P کے۔

(۵) شکل بالا میں ثابت کرو کہ

$$SN \times SQ = SO_1 \times SO_2 = ST \times ST$$

جہاں T اور S دیے ہوئے دائروں کے ایک راست مشترک مماس کے نقاط تماس ہیں۔

(۶) ثابت کرو کہ ایک مثلث کے عاٹ اور نو نقطی دائروں کی مشابہت کے

مرکز مثلث کے عمودی مرکز اور ہندسی مرکز ہیں۔

(۷) ثابت کرو کہ دو مساوی دائروں کی سیدھی مشابہت کا مرکز اتنا ہی پر ہے۔

(۸) (۱) (۲) (۳) اور (۴) تین دیے ہوئے دائرے ہیں جن کے مرکز ہم خط نہیں ہیں۔ دائروں (۱) اور (۲) کی سیدھی اور آڑی مشابہت کے مرکز بالترتیب $ش$ اور $ش$ ہیں۔ اور دائروں (۲) اور (۳) کی سیدھی اور آڑی مشابہت کے مرکز بالترتیب $ش$ اور $ش$ ہیں اور دائروں (۳) اور (۴) کی سیدھی اور آڑی مشابہت کے مرکز بالترتیب $ش$ اور $ش$ ہیں۔ ثابت کرو کہ


(۱) $ش$ ، $ش$ ، اور $ش$ متراکز ہیں

(۲) چھ نقطوں $ش$ ، $ش$ ، $ش$ ، $ش$ ، $ش$ ، $ش$ میں سے ایسے


تین تین نقطوں کے چار جٹ ہیں جو ہم خط ہیں۔

۴۹۔ ایک دائرے کے ان وتروں کے سروں پر کے حاسوں کے

نقطہ تقاطع کا طریق جو ایک ثابت نقطہ میں سے گزرتے ہیں ایک خط مستقیم ہے۔



شکل ۲



شکل ۱

فرض کرو کہ دائرہ (و) کی سطح میں ایک ثابت نقطہ $ن$ ہے۔ $ن$ میں گزرتے والا کوئی خط دائرہ (و) سے نقاط $ا$ اور $ب$ پر ملتا ہے اور $ا$ اور $ب$ پر کے

ماسات کا نقطہ تقاطع ط ہے۔ ثابت کرنا ہے کہ ط کا طریق ایک خط مستقیم ہے۔
 ون کو ملاؤ اور ط سے ون پر عمود ط ع نکالو
 فرض کرو کہ و ط اور اب کا نقطہ تقاطع ف ہے
 وب کو ملاؤ۔

چونکہ ف اور ع پر کے زاویے قائمے ہیں
 اس لیے نقاط ف، ع، ن، ط مشترک المیض ہیں۔
 اس لیے ون \times وع = و ط \times وف = وب \times و ب ایک متقل مقدار ہے۔
 اب چونکہ و اور ن ثابت نقطے ہیں اس لیے ع بھی ایک ثابت نقطہ ہے
 اور نقطہ ن میں سے گزرنے والے کسی وتر اب کے سروں پر گئے ماسوں کا نقطہ
 تقاطع ط ایک ثابت خط مستقیم پر واقع ہے جو ثابت نقطہ ع میں سے گزرتا
 ہے اور ون پر عمود وار ہے۔ انہیں مسئلہ ثابت ہوا۔

نوٹ :- یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ع ط پر کے کسی نقطہ سے دائرہ (و)
 تک کھینچے ہوئے ماسوں کا وتر تمام اس نقطہ ن میں سے گزرتا ہے۔ پس خط ع ط
 طریق کے دونوں شرائط کو پورا کرتا ہے۔


۵۰۔ تعریفیات - دفعہ گزشتہ کی ترتیم کے مطابق نقطہ ط
 کا طریق دیے ہوئے دائرہ (و) کے لمحاظ سے نقطہ ن کا قطبی کہلاتا ہے اور
 نقطہ ن دیے ہوئے دائرہ (و) کے لمحاظ سے خط ع ط کا قطب کہلاتا ہے۔
 اگر دائرہ کے مرکز میں سے گزرنے والے کسی خط پر مرکز کی ایک ہی جانب
 نقاط ن اور ن اس طرح لیے جائیں کہ ون \times ون = ر جہاں ر دائرہ
 (و) کا نصف قطر ہے تو نقاط ن، ن میں سے ہر ایک بلحاظ دائرہ (و) کے
 دوسرے نقطہ کا مقلوب کہلاتا ہے۔ مثلاً دفعہ گزشتہ کی شکل میں نقاط ن او
 ع بلحاظ دائرہ (و) کے ایک دوسرے کے مقلوب ہیں، پس حاصل ہوا کہ بلحاظ
 دائرہ (و) کے نقطہ ن کا قطبی ایک خط مستقیم ہے جو ن کے مقلوب میں سے
 گزرتا ہے اور ون پر عمود وار ہے۔

۵۱۔ چونکہ ون \times ون = ر جہاں ر دائرہ (و) کا نصف قطر ہے

اس لیے \angle و \angle بڑا ہے، مساوی ہے، چھوٹا ہے \angle و \angle سے بڑا ہے۔ کہ
 \angle چھوٹا ہے یا مساوی ہے یا بڑا ہے نصف قوس سے
 پس حاصل ہوا کہ محیط دائرہ (و) کے نقطہ \angle کا قطبی دائرہ (و) کو قطع نہیں کرتا
 ہے یا اس کرتا ہے یا قطع کرتا ہے بموجب اس کے کہ نقطہ \angle دائرہ کے اندر ہے
 دائرہ پر ہے یا دائرہ کے باہر ہے۔

۵۲۔ مسئلہ۔ اگر نقطہ \angle دائرہ (و) کے باہر ہو تو \angle کا
 قطبی \angle حاسات کا وتر تماس ہے جو \angle سے دائرہ (و) تک پہنچے
 جائیں۔

نقطہ \angle سے دائرہ (و) کے حاسات \angle سے \angle تک پہنچیں۔




فرض کرو کہ وتر تماس \angle سے \angle تک پہنچتا ہے۔
 چونکہ مثلث \angle قائم الزاویہ ہے اور \angle عمود ہے و \angle و \angle پر
 اس لیے \angle و \angle = \angle و \angle

اس لیے محیط دائرہ (و) کے نقاط \angle اور \angle ایک دوسرے کے

متعلق ہیں۔

نیز وتر تماس \angle سے \angle تک نقطہ \angle کے قطب \angle میں سے گزرتا ہے

اور ون پر عمود وار ہے۔
 اس لیے بلحاظ دائرہ (و) کے نقطہ ن کا قطبی وتر تمامیت میں ہے۔
 ۳۵۔ اگر بلحاظ دائرہ (و) کے نقطہ ا کا قطبی نقطہ ب
 میں سے گزرے تو ب کا قطبی ا میں سے گزرے گا۔



فرض کرو کہ دائرہ (و) کے لمحات سے ا کا قطبی خط ل م ہے
 جب مفروض خط ل م نقطہ ب میں سے گزرے گا ہے
 فرض کرو کہ و ا اور ل م کا نقطہ تقاطع م ہے
 و ب کو ملاؤ اور اسے و ب پر عمود ا ن نکالو۔
 چونکہ م اور ن پر کے زاویے قائمہ زاویے ہیں
 اس لیے ون \times و ب = و م \times و ا = ر ا جہاں ر و دائرہ (و) کا
 نصف قطر ہے۔

اس لیے بلحاظ دائرہ (و) کے ب کا مطلوب ن ہے
 نیز ا عمود ہے و ب پر

اس لیے ب کا قطبی ن اسے اور یہ خط نقطہ ا میں سے گزرتا ہے
پس مسئلہ ثابت ہوا۔

نوٹ :- اس مسئلہ کو قطب اور قطبی کی متکافی خاصیت سے موسوم کرتے ہیں۔
مندرجہ بالا مسئلہ سے ظاہر ہے کہ اگر ایک دائرہ کے لحاظ سے دو خطوط میں سے
ایک کا قطب دوسرے پر ہو تو دوسرے کا قطب پہلے پر ہوگا۔

۵۴۔ تعریفات


(۱) ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے دو دیے ہوئے نقطے
مزدوج نقطے کہلاتے ہیں اگر ان نقطوں میں سے کسی کا ایک قطبی دوسرے
نقطہ میں سے گزرے۔

(۲) ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے دو دیے ہوئے خطوط
مزدوج خطوط کہلاتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک خط کا قطب دوسرے
خط پر واقع ہو۔

(۳) اگر ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے ایک مثلث کے ہر رأس کا
قطبی مقابل کا ضلع ہو تو مثلث مذکور دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے مثلث
مزدوج بالذات کہلاتا ہے۔

* ۵۵۔ مسئلہ۔ اگر ایک ثابت نقطہ ن میں سے کوئی خط کھینچا جائے

جو ایک دیے ہوئے دائرہ (و) سے تقاطع اور ب پر اور نقطہ ن کے قطبی
سے ف پر ملے تو اب کی موسیقی تقسیم ن اور ف پر ہوتی ہے۔



صورت اول۔ فرض کرو کہ ثابت نقطہ ن دائرہ کے اندر ہے۔

فرض کرو کہ ون، ن کے قطبی سے ل پر ملتا ہے۔

تب $ون \times ن ل = ون (ول - ون) = ون \times ول - ون^2$ ۔
 $= وا^2 - ون^2$ (کیونکہ $ون \times ول = وا^2$)

نیز $بن \times ن ا = وا^2 - ون^2$ ۔

اس لیے $ون \times ن ل = بن \times ن ا$

یعنی نقاط و، ب، ل، ا مشترک المحيط ہیں۔

نقاط و، ب، ل، ا میں سے گزرنے والا دائرہ کھینچو۔

اس دائرہ کا وتر و ب = وتر و ا، کیونکہ ہر ایک وتر دائرہ (و) کے نصف قطر کے مساوی ہے۔ اس لیے و ا اور و ب کے محاذی ل پر مساوی زاویے بنتے ہیں۔


یعنی ل ن اندرونی مُنصف ہے ب ل ا کا

نیز چونکہ ن ل ف قائمہ ہے

اس لیے ل ف خارجی ناصف ہے ب ل ا کا

اس لیے ا ب کی موسیقی تقسیم ن اور ف پر ہوتی ہے۔

صورت دوم۔ فرض کرو کہ ثابت نقطہ ن دائرہ کے باہر ہے۔



چونکہ ن کا قطبی ف میں سے گزرتا ہے اس لیے ف کا قطبی ن میں سے گزریگا۔ اس لیے صورت اول کی رو سے اب کی موسیقی تقسیم ن اور ف پر ہوتی ہے۔
پس مسئلہ ثابت ہوا۔

نوٹ :- اس مسئلہ کو ”قطب اور قطبی کی موسیقی غاصیت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس دفعہ کے مسئلہ کا عکس حسب ذیل ہے :-
اگر ایک ثابت نقطہ ن میں سے کوئی خط کھینچا جائے جو ایک دیے ہوئے دائرہ (و) سے نقاط ۱ اور ب پر ملے اور اب پر ایک نقطہ ف ایسا لیا جائے کہ اب کی موسیقی تقسیم ن اور ف پر ہوتی ہو تو ف کا طریق ن کا قطبی ہوگا۔
اس کا ثبوت طالب علم مشق کے طور پر خود بہم پہنچائے۔


امثلہ ۵

- (۱) ثابت کرو کہ دو نقطوں کو ملائے والا خط ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے ان نقطوں کے قطبیوں کے نقطہ تقاطع کا قطبی ہے۔
- (۲) ثابت کرو کہ دو خطوط مستقیم کا نقطہ تقاطع ایک دائرہ کے لحاظ سے ان خطوط کے قطبیوں کو ملائے والے خط کا قطب ہے۔
- (۳) ثابت کرو کہ ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے متراکز خطوط کے قطب ہم خط ہیں۔
- (۴) ثابت کرو کہ ایک دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے ہم خط نقطوں کے قطبی متراکز ہیں۔
- (۵) بلحاظ دائرہ (و) کے نقاط ۱ اور ب کے قطبی لے گئے ہیں۔ ثابت کرو کہ ۱ و ب مساوی ہے اس زاویہ کے جو ۱ اور ب کے قطبیوں سے بنتا ہے۔
- (۶) دو ہم مرکز دائروں میں سے کسی ایک کے ماسوں کے قطبیوں کا طریق بلحاظ دوسرے دائرہ کے معلوم کرو۔
- (۷) ثابت کرو کہ ایک دائرہ کے مساوی وتروں کے قطبیوں کا طریق دائرہ مذکور کے

لحاظ سے ایک ہم مرکز دائرہ ہے۔
 (۸) دائرہ (و) کے لحاظ سے ا اور ب مزدوج نقطے ہیں اور خط اب کا قطب ج ہے ثابت کرو کہ دائرہ (و) کے لحاظ سے مثلث اب ج مزدوج بالذات ہے۔
 (۹) اگر ایک مثلث بلحاظ ایک دائرہ کے مزدوج بالذات ہو تو ثابت کرو کہ مثلث کا عمودی مرکز دائرہ کے مرکز پر ہوگا۔

(۱۰) اگر دائرہ (و) کے لحاظ سے نقاط ا اور ب کے قطبی لیے جائیں اور ب کے قطبی پر عمود ال اور ب سے ا کے قطبی پر عمود ب م نکالے جائیں تو ثابت کرو کہ وا : وب = ال : ب م

[اس نتیجہ کو سامن (Salmon) کا مسئلہ کہتے ہیں۔]
 (۱۱) اگر ایک ویسے ہوئے بیرونی نقطہ ن میں سے کوئی خط کھینچا جائے جو دائرہ (و) سے ا اور ب پر اور ن کے قطبی سے ف پر لے تو ثابت کرو کہ ن ا اور ن ب کا موسیقی اوسط ن ف ہے۔



فرہن کرو کہ دائرہ (و) کے لحاظ سے ن کا قطبی خط ون سے ل پر اور دائرہ (و) سے م پر ملتا ہے۔

ن م اور و م کو ملاؤ اور و سے اب پر عمود و ع نکالو۔
 چونکہ ن م دائرہ (و) کا مکس ہے

اس لیے $ن ۱ \times ن ۲ = ن ۱ \times ن ۲$ و (کیونکہ $ن ۱$ قائمہ ہے)
 $ن ۱ \times ن ۲ = ن ۱ \times ن ۲$ (کیونکہ نقاط $ع$ ، $ف$ ، $ل$
 مشترک المحيط ہیں)

اس لیے $ن ۱ \times ن ۲ = ن ۱ \times ن ۲$
 $ن ۱ \times ن ۲ = ن ۱ \times ن ۲$ (کیونکہ $ا$ ، $ب$ کا
 وسطی نقطہ $ع$ ہے)

$$\frac{ن ۱ \times ن ۲}{ن ۱ + ن ۲} = ن ۱ \times ن ۲$$

یعنی $ن ۱$ موسیقی اوسط ہے $ن ۱$ اور $ن ۲$ کا۔

* ۵۶۔ **تقلیب**۔ دفعہ ۵۰ کی تعریف کی مدد سے ہم ایک
 دیے ہوئے دائرہ کے لحاظ سے جس کا نصف قطر ہو ایک دیے ہوئے
 نقطہ $ن$ کا مقلوب نقطہ $ن$ معلوم کر سکتے ہیں۔ دائرہ کے مرکز و کو تقلیب کا
 مرکز اور نصف قطر کو تقلیب کا نصف قطر کہتے ہیں۔
 نیز بعض اوقات $ن$ کو تقلیب کا مستقل کہتے ہیں۔ اور دائرہ کو
 تقلیب کا دائرہ کہتے ہیں۔


اگر $ن$ کوئی طریق مرتسم کرے تو $ن$ کے مقلوب $ن$ کے طریق کون کے
 طریق کا مقلوب کہتے ہیں۔

مندرجہ بالا تعریفات سے ظاہر ہے کہ تقلیب کے مرکز میں سے گزرنے والا
 ہر خط اپنا آپ مقلوب ہے۔

* ۵۷۔ **مسئلہ**۔ ایک ایسے خط مستقیم کا مقلوب جو تقلیب کے
 مرکز میں سے نہ گزرے تقلیب کے مرکز میں سے گزرنے والا ایک دائرہ ہوگا۔
 فرض کرو کہ دیا ہوا خط مستقیم $ا$ ، $ب$ ہے اور تقلیب کا مرکز $و$ اور
 تقلیب کا نصف قطر $ر$ ہے۔

و سے $ا$ پر عمود $و$ نکالو اور $ع$ کا مقلوب $ع$ معلوم کرو۔

نیز $ا$ پر کے کسی نقطہ $ن$ کا مقلوب $ن$ معلوم کرو۔



بموجب تعریف $و ع \times و ع = و ن$
اور $و ن \times و ن = و ن$

$و ع \times و ع = و ن \times و ن$
نقاط 'ع'، 'ع'، 'ن' مشترک المخیط ہیں۔


$و ن \times و ع = و ع \times و ن$ قائمہ زاویہ

اس لیے $و ع$ کے محاذی $ن$ پر زاویہ قائمہ بنتا ہے
اس لیے $ن$ کا طریق یعنی خط مستقیم $اب$ کا مقلوب $و ع$ قطر پر کا
دائرہ ہے۔

نوٹ۔ مسئلہ بالا کی شکل میں نقاط $ن$ اور $ب$ ایک دوسرے کے مقلوب ہیں
اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ ایسے دائرہ کا مقلوب جو تقلیب کے مرکز میں سے
گزرتا ہے ایک خط مستقیم ہے جو دیے ہوئے دائرہ کے اس قطر پر جو تقلیب کے مرکز میں سے
گزرتا ہے عمود وار ہے اور تقلیب کے مرکز میں سے نہیں گزرتا ہے۔

۵۸۔ ایک ایسے دائرہ کا مقلوب جو تقلیب کے مرکز میں سے نہیں
گزرتا ہے ایک دائرہ ہے جو تقلیب کے مرکز میں سے نہیں گزرتا ہے۔

فرض کرو کہ تقلیب کا مرکز $و$ اور تقلیب کا مستقل $و ع$ ہے۔ نیز فرض کرو کہ
دیے ہوئے دائرہ (ج) پر کے کسی نقطہ کا مقلوب $ن$ ہے۔



تقلیب کے مرکز سے دائرہ (ج) کا ایک ہاں و ت کھینچو فہرہ کرو کہ
 طول و ت = م
 نیز فہرہ کرو کہ خط و ن دائرہ (ج) سے گزرے نقطہ ق پر ملتا ہے۔
 ق ج کو ملاؤ اور ن م متوازی ق ج کے کھینچو ج و ج سے م پر ملے۔
 چونکہ و ت × و ن = و ن
 اور و ن × و ق = م

اس لیے $\frac{و ت}{و ق} = \frac{ن م}{ج ق}$ جو ایک مستقل مقدار ہے

نیز مشابہ مثلثات و م ن اور و ج ق سے

$$\frac{و م}{و ج} = \frac{ن م}{ج ق} = \frac{و ن}{و ق} \text{ جو ایک مستقل مقدار ہے}$$


اس لیے م ایک ثابت نقطہ ہے اور م ن کا طول مستقل ہے۔
 پس ثابت ہو کہ ن م کا طریق یعنی دیے ہوئے دائرہ (ج) کا مقلوب
 بلحاظ مرکز و کے ایک دائرہ ہے جس کا مرکز م ہے۔

* ۵۹۔ تقریبات

(۱) اگر ایک منحنی پر دو نقطے ن اور ق ہوں تو وتر ن ق کا

انہرانی مقام جب کہ نقطہ ق منحنی پر حرکت کر کے نقطہ ن کے بہ انتہا قریب آجاتا ہے منحنی کے نقطہ ن پر کاماس کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے ظاہر ہے کہ خط مستقیم کے کسی نقطہ پر کاماس خود ہی خط مستقیم ہے۔


(۲) دو متقاطع منحنیوں کے نقطہ تقاطع پر کے ماسوں کا درمیانی زاویہ منحنیوں کا زاویہ تقاطع کہلاتا ہے۔
 * ۱۰۔ قلب کے مرکز میں سے گزرنے والا کوئی خط مستقیم ایک منحنی اور اس کے مقلوب کو مکمل زاویوں پر قطع کرتا ہے۔



فرض کرو کہ قلب کا مرکز و اور نصف قطر ہے۔
 منحنی پر دو نقطے ن اور ق ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ان کے مقلوب ن اور ق میں جولازا ایک دوسرے کے قریب واقع ہونگے۔
 ق ن کو متانک اور ق ن کو متانک خارج کرو۔
 ون × ون = وق × وق کیونکہ ہر ایک مقدار قلب کے مستقل ر کے مساوی ہے۔

اس لیے ن، ن، ق، ق مشترک المیہ ہیں۔
 اس لیے زاویہ ون ت اور وق ت مکمل زاویہ ہیں۔
 اب چونکہ نقطہ ق نقطہ ن کے قریب آتا ہے ویسے ہی نقطہ ق ہی ن کے قریب آئے گا اور انہما میں خطوط ق ن ت اور ق ن ت بالمشترک

نقاط اورن پر منحنیوں کے مماسات ن ت اور ن ت بن جائینگے۔
نیز و ق ن کی انتہائی قیمت و ن ت کے مساوی ہوگی۔



اس لیے و ن ت اور و ن ت مکمل زاویے ہیں۔ یہی ثابت کرنا تھا۔
نوٹ :- مندرجہ بالا نتیجہ کی مدد سے یہ آسانی ثابت ہو سکتا ہے کہ دو متقاطع
منحنیوں کا زاویہ تقاطع ان کے مقلوبوں کے زاویہ تقاطع کے مساوی ہوتا ہے۔ نیز اگر
دو منحنی ایک دوسرے کو کسی نقطہ ق پر مس کریں تو ان کے مقلوب بھی ایک دوسرے
کو ق کے مقلوب نقطہ ق پر مس کریں گے۔

۶۱۔ تعریف :- اگر دو دائروں کا زاویہ تقاطع زاویہ قائمہ ہو تو
یہ دائرے علی القوائم دائرے کہلاتے ہیں۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ یہ دائرے
ایک دوسرے کو علی القوائم قطع کرتے ہیں۔

اس تعریف سے ظاہر ہے کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو علی القوائم
قطع کریں تو کسی ایک نقطہ تقاطع پر ہر دائرہ کا مماس دوسرے دائرہ کے
مرکز میں سے گزرے گا۔

مندرجہ بالا نتیجہ کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے ”دو علی القوائم دائروں
کے کسی ایک نقطہ تقاطع تک پہنچے ہوئے نصف قطر ایک دوسرے پر
علی القوائم ہوتے ہیں اور دائروں کے مرکزوں کے درمیانی فاصلہ کا
مربع اُن کے نصف قطروں کے مربعوں کے مجموعہ کے مساوی ہوتا
ہے۔“

امثلہ ۱۶

(۱) اگر تغلیب کے مرکز میں سے گزرنے والے ایک خط مستقیم پر کے تین نقطوں ن، ق، ط کے مقلوب ن، ق، ط ہوں تو ثابت کرو کہ (و) اگر و ن، وق، و ط سلسلہ حسابیہ میں ہوں تو و ن، وق، و ط سلسلہ موسیقیہ میں ہونگے۔ (ب) و ن، وق، و ط سلسلہ ہندسیہ میں ہوں تو و ن، وق، و ط سلسلہ ہندسیہ میں ہونگے۔

(۲) ایک خط مستقیم ایک دائرہ کو قطع کرتا ہے۔ ثابت کرو کہ تغلیب کے مرکز اور نصف قطر کے مناسب انتخاب سے دیا ہوا خط دیے ہوئے دائرہ میں منقلب کیا جاسکتا ہے۔

(۳) اگر ایک دیے ہوئے دائرہ کے باہر کے کسی نقطہ پر تغلیب کا مرکز لیا جائے تو ثابت کرو کہ تغلیب کے نصف قطر کے مناسب انتخاب سے دیا ہوا دائرہ اپنے آپ میں منقلب ہو سکتا ہے۔

(۴) اگر تغلیب کے مرکز و اور نصف قطر کے لحاظ سے نقاط ن اور ق کے مقلوب ن اور ق ہوں تو ثابت کرو کہ $ن ق = و ن \times و ق$ ۔

(۵) اگر تغلیب کے مرکز میں سے گزرنے والے کسی خط پر کے دو نقطوں ن اور ق کے مقلوب ن اور ق ہوں اور تغلیب کے دائرہ پر کوئی نقطہ لا ہو تو ثابت کرو کہ $ن ق = ن ق$ ۔

(۶) اُن دائروں کے مرکروں کا طریق معلوم کرو جو ایک دیے ہوئے دائرہ کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر علی القوائم قطع کریں۔

(۷) ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر علی القوائم قطع کرے۔


(۸) ایک دیے ہوئے نصف قطر والا ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے دائرہ کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر علی القوائم قطع کرے۔

(۹) ثابت کرو کہ دو علی القوائم دائروں میں سے ایک کے کسی قطر کی موسیقیہ تقسیم

دوسرے کے محیط پر ہوتی ہے۔ (دیکھو دفعہ ۹۲)۔

(۱۰) بلحاظ دائرہ (و) کے نقطہ ن کا متقارب ن ہے ثابت کرو کہ تقاطع
ن اور ن میں سے گزرنے والا ہر دائرہ (و) کو علی القوائم قطع کرتا ہے۔
(۱۱) بلحاظ دائرہ (و) کے تقاطع ن اور ق مزدوج نقطے ہیں۔ ثابت کرو کہ
وہ دائرہ جن کا قطر ن ق ہے، دائرہ (و) کو علی القوائم قطع کرتا ہے۔

۹۲۔ مسئلہ۔ اس نقطہ کا طریق جس سے دو دیے ہوئے دائرہوں
تک پہنچے ہوئے مماس مساوی ہوں ایک خط مستقیم ہے جو دائرہوں کے مرکزوں کو
ملائے والے خط پر عمود وار ہوتا ہے۔



فرض کرو کہ (و) اور (م) دو دیے ہوئے دائرے ہیں جن کے نصف قطر
بالترتیب لہ اور پ ہیں۔ نیز فرض کرو کہ نقطہ ط سے ان دائرہوں تک پہنچے
ہوئے مماسات ط ت اور ط ت مساوی ہیں۔
و ط، و ت، و ط اور و ت کو ملاؤ اور ط سے و پر عمود ط ع
نکالو۔

چ کہ حسب مفروض ط ت = ط ت
و ط ت = ط ت
و ط و - و ت = ط و - و ت

$$\therefore \text{ع ط} + \text{و ع} - \text{و ت} = \text{ع ط} + \text{و ع} - \text{و ت}$$

$$\therefore \text{و ع} - \text{و ع} = \text{و ت} - \text{و ت}$$

$$= \text{و} - \text{و} \text{ جو ایک مستقل مقدار ہے۔}$$

$$\text{لیکن } \text{و ع} - \text{و ع} = (\text{و ع} + \text{و ع}) - (\text{و ع} - \text{و ع})$$

$$= \text{و و} (۲ \text{ ص ع}) \text{ جہاں } \text{و و} \text{ کا وسطی نقطہ ص ہے۔}$$

$$\therefore ۲ \text{ و و} \times \text{ص ع} = \text{و} - \text{و} \text{ جس سے حاصل ہوتا ہے کہ مرکزوں کو}$$

ملائے والے خط پر ع ایک ثابت نقطہ ہے۔

پس ثابت ہوا کہ نقطہ ط کا طریق ایک خط مستقیم ہے جو مرکزوں کے

خط پر عمود وار ہے۔

نوٹ۔ ثبوت بالا میں یہ بات ضمناً ثابت ہوئی ہے کہ نقطہ ع مرکزوں کے

خط کو دو ایسے حصوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے مربعوں کا فرق دیے ہوئے دائروں کے نصف قطروں کے مربعوں کے فرق کے مساوی ہے۔

طالب علم بطور مشق کے یہ ثابت کرے کہ اس صورت میں طریق کی دوسری شرط بھی

پوری ہوتی ہے یعنی اس طریق پر کے کسی نقطہ سے دائروں تک کھینچے ہوئے حماسات

مساوی ہیں۔

۴۳۔ تعریف۔ اس نقطہ کا طریق جس سے دو دیے ہوئے دائروں

تک کھینچے ہوئے حماس مساوی ہوں دیے ہوئے دائروں کا بیانیہ دئی محور کہلاتا ہے۔

نوٹ (۱)۔ اگر دیے ہوئے دائرے متقاطع ہوں تو صرفاً ان کے نقاط

تقاطع مطلوبہ طریق پر واقع ہیں۔ اس لیے مطلوبہ طریق ان نقاط تقاطع میں سے


گزرنے والا خط مستقیم یعنی دیے ہوئے دائروں کا وتر مشترک (محدودہ) ہے۔ وتر مشترک

کے اس حصہ پر کے کسی نقطہ سے جو دیے ہوئے دائروں کے اندر ہے دائروں کے کوئی حقیقی

حماس نہیں کھینچ سکتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ خیالی حماس کھینچ سکتے ہیں اور ان کے خیالی طول

مساوی ہیں۔ اس نکتہ کی مزید تشریح ہندسہ تحلیلی کی کسی کتاب میں پائی جاسکتی ہے۔

نوٹ (۲) - اگر دیے ہوئے دائرے غیر متقاطع ہوں تو نقطہ $ع$ دونوں دائروں کے باہر واقع ہوگا۔ اس لیے مطلوبہ طریق کائنۂ دونوں دائروں کے باہر واقع ہوگا۔
۶۴۔ دو دیے ہوئے دائروں (و) اور (پ) کا بنیادی محور کھینچنا۔



کوئی دائرہ کھینچو جو دائرہ (و) کو (ا) اور (ب) پر اور دائرہ (پ) کو (ج) اور (د) پر قطع کرے۔ اب اور (ج) د کے نقطہ تقاطع $ط$ سے مرکزوں کے خط $و$ پر غور ہو کر $ط$ نکالو۔

تب $ط$ $ع$ مطلوبہ بنیادی محور ہوگا۔

نقطہ $ط$ سے دائروں (و) اور (پ) کے مماس $ط$ $ا$ اور $ط$ $ج$ کھینچو۔

$$ط$$
 $ا$ $= ط$ $ج$ $\times ط$ $ب$ (۱)

$$اور ط$$
 $ج$ $= ط$ $ا$ $\times ط$ $د$ (۲)

چونکہ نقاط $ط$ $ا$ $ب$ $ج$ $د$ مشترک محیط ہیں۔

$$اس لیے ط$$
 $ا$ $\times ط$ $ب$ $= ط$ $ج$ $\times ط$ $د$ (۳)

(۱) (۲) اور (۳) سے حاصل ہوتا ہے


$$ط$$
 $ا$ $= ط$ $ج$

$$ط$$
 $ب$ $= ط$ $د$

یعنی

یعنی نقطہ ط دیے ہوئے دائروں (و) اور (پ) کے بنیادی محور پر کا ایک نقطہ ہے۔ اور چونکہ ط ع مرکزوں کے خط و پ پر عمود ہے، اس لیے ط ع دیے ہوئے دائروں کا بنیادی محور ہے۔
 نوٹ۔ متقاطع دائروں کا بنیادی محور کھینچنے کے لیے اس طولانی عمل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے نقاط تقاطع میں سے گزرنے والا خط مستقیم ہی بنیادی محور ہوتا ہے۔

۶۵۔ مسئلہ۔ اگر ایسے دائرے کھینچے جائیں جن کے مرکز ایک دیے ہوئے دائرہ کے ایک قطر محدودہ پر ہوں اور جو دیے ہوئے دائرہ کو علی القوائم قطع کریں تو ان دائروں میں سے کسی دو دائروں کا بنیادی محور وہ خط مستقیم ہوگا جو دیے ہوئے دائرہ کے مرکز میں سے گزرے اور دیے ہوئے قطر پر عمود وار ہو۔



فرض کرو کہ دیا ہوا دائرہ (ع) ہے۔ اس کے ایک ثابت قطر اب محدودہ پر کوئی نقطہ و لو اور و کو مرکز مان کر ایک دائرہ کھینچو جو دائرہ (ع) کو نقطہ ن پر

علی القوائم قطع کرے۔ دیے ہوئے دائرہ کے مرکز ع میں سے ایک خط مستقیم کھینچو جو ثابت قطر اب پر عمود وار ہو اور اس قطر پر کوئی نقطہ ط لو اور ط سے دائرہ (و) کا محاسن ط ت کھینچو۔

وط، ون، ع ن اور ط ب کو ملاؤ۔

تب ط ت = ط و - ون

= ط ع + و ع - (و ع - ع ن)

= ط ع + ع ن

= ط ع + ع ب

= ط ب جو و کے تمام مقاموں کے لیے مستقل ہے۔

اس لیے دائرہ (و) جیسے کسی دو دائروں کا بنیادی محور خط مستقیم ع ط ہے یہی ثابت کرنا تھا۔

نوٹ۔ چونکہ نقطہ ع دائرہ (و) کے باہر واقع ہے اس لیے بنیادی محور ع ط

دائرہ (و) کو قطع نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ (و) جیسے دائروں میں سے کوئی دو دائرے ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے ہیں۔

۴۴۔ تقریفات۔ اگر دائروں کا ایک نظام ایسا ہو کہ ان میں

کسی دو دائروں کا ایک ہی بنیادی محور ہو تو یہ دائرے ہم محور دائرے کہلاتے ہیں۔

دفعہ گذشتہ میں نہ قطع کرنے والے ہم محور دائروں کا ایک نظام حاصل

کرنے کے طریقہ کی تشریح کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دائرہ (و) کا مرکز دائرہ (ع)

کے قطر اب کے اندر واقع نہیں ہو سکتا

یعنی و ع لا ۱۴ -

نیز ون = و ع - ع ن

= و ع - ع ا

اس لیے جوں جوں نقطہ و دائرہ (ع) کے قریب آتا ہے، ویسے ہی


دائرہ (و) کا نصف قطر بتدریج گھٹتا ہے اور جب نقطہ و نقاط ا اور ب میں

سے کسی ایک پر منطبق ہوتا ہے تو دائرہ (و) کا نصف قطر صفر ہے۔ نقاط ا اور ب

ہم محور دائروں کے اُس نظام کے انتہائی نقطے کہلاتے ہیں جس کا ہر کین دائرہ
(ع) کو علی القوام قطع کرتا ہے۔ ہم محور دائروں کے نظام کے انتہائی نقطے
نظام کے نقطہ دائرے بھی کہلاتے ہیں۔

اگر متعدد دائرے ایسے ہوں کہ ان میں سے ہر ایک دائرہ دو ثابت
نقطوں میں سے گزرتا ہے تو ان دائروں سے قطع کرنے والے ہم محور دائروں کا
ایک نظام حاصل ہوتا ہے اور اس نظام کا چھوٹے سے چھوٹا دائرہ وہ دائرہ ہے جو
وتر مشترک کے قطر پر کھینچا گیا ہے۔ اس لیے قطع کرنے والے ہم محور دائروں کے
نظام کی صورت میں انتہائی نقطے یا نقطہ دائرے وجود نہیں رکھتے ہیں۔

۶۔ مسئلہ - تین دائروں میں سے دو دو دائروں
کے تین بنیادی محور متراکز ہوتے ہیں۔



فرض کرو کہ (۱)، (۲) اور (۳) تین دیے ہوئے دائرے ہیں۔
نیز فرض کرو کہ دائروں (۱) اور (۲) کا بنیادی محور دائروں (۱) اور (۲)
کے بنیادی محور کو نقطہ ط پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کرنا ہے کہ دائروں (۱) اور (۲) کے

بنیادی محور نقطہ ط میں سے گزرتا ہے۔

چونکہ نقطہ ط دائروں (و) اور (پ) کے بنیادی محور پر ہے، اس لیے ط سے دائروں (و) اور (پ) تک کھینچے ہوئے مماثلوں کے طول مساوی ہیں۔ اسی طرح سے ط سے دائروں (پ) اور (و) تک کھینچے ہوئے مماثلوں کے طول بھی مساوی ہیں۔

اس لیے ط سے دائروں (و) اور (پ) تک کھینچے ہوئے مماثلوں کے طول مساوی ہیں۔

اس لیے نقطہ ط دائروں (و) اور (پ) کے بنیادی محور پر واقع ہے۔ یعنی دائروں (و) اور (پ) کا بنیادی محور نقطہ ط میں سے گزرتا ہے۔
تعریف - تین دائروں میں سے دو کے تین بنیادی محوروں کے نقطہ تراکز کو ان دائروں کا بنیادی مرکز کہتے ہیں۔

نوٹ (۱) - اگر دیے ہوئے تینوں دائروں کے مرکز ہم خط ہوں تو ظاہر ہے کہ تینوں بنیادی محوری ہونگے اور اس صورت میں ان کا نقطہ تقاطع یعنی بنیادی مرکز لاتسنا ہی پر ہوگا۔

نوٹ (۲) - اگر بنیادی محوروں کا نقطہ تقاطع دیے ہوئے تین دائروں میں سے ایک کے اندر ہو (جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے دو دائروں کے بھی اندر ہوگا) تو نقطہ ط سے دیے ہوئے دائروں تک حقیقی مماس نہیں کھینچ سکتے۔ اس لئے مسئلہ بالا کے ثبوت میں مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت بطور مشق کے طالب علم خود بہم پہنچائے۔

نوٹ (۳) - اگر بنیادی محوروں کا نقطہ تقاطع ط دائروں کے اندر ہو تو اس صورت میں بھی نقطہ ط کو دیے ہوئے تین دائروں کا بنیادی مرکز کہتے ہیں۔ ہندسہ تجلیلی میں یہ ثابت کیا جائیگا کہ اس صورت میں بنیادی مرکز سے دیے ہوئے تین دائروں تک کھینچے ہوئے خیالی مماسات کے خیالی طول مساوی ہیں۔

مسئلہ ۱

(۱) ثابت کرو کہ دو دائروں کا بنیادی محور ان دائروں کے مشترک مماسوں

کی تنصیف کرتا ہے۔

(۲) اگر دو دائروں کے بنیادی محور پر کے کسی نقطہ سے ان دائروں میں سے کسی ایک کا تماس کھینچا جائے تو ثابت کرو کہ وہ دائرہ جس کا مرکز یہ نقطہ ہے اور نصف قطر تماس کا طول ہے دیے ہوئے دونوں دائروں کو علی القوائم قطع کرتا ہے۔

(۳) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو مس کریں تو ثابت کرو کہ ان کا بنیادی محور نقطہ تماس پر کا مشترک تماس ہے۔

(۴) اگر تین دائروں میں سے ہر دو ایک دوسرے کو مس کریں تو ثابت کرو نقاط تماس پر کے تماس مسترا کر ہوتے ہیں۔

(۵) اگر ایک مثلث کے ضلعوں کو قطران کر تین دائرے کھینچے جائیں تو ثابت کرو کہ ان دائروں کا بنیادی مرکز مثلث کا مرکز عمودی ہے۔

(۶) تین دیے ہوئے دائروں کا بنیادی مرکز وہ ہے اور وہ سے ان دائروں میں سے کسی ایک کا تماس و ت کھینچا گیا ہے۔ ثابت کرو کہ وہ دائرہ جس کا مرکز و اور نصف قطر وہ ہے دیے ہوئے تینوں دائروں کو علی القوائم قطع کرتا ہے۔

(۷) ثابت کرو کہ وہ تمام دائرے جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزریں اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو علی القوائم قطع کریں ایک اور ثابت نقطہ میں سے بھی گزریں گے۔

(۸) ان دائروں کے مرکزوں کا طریق معلوم کرو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزریں اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو علی القوائم قطع کریں۔

(۹) ایک دائرہ کھینچو جو دو دیے ہوئے نقطوں میں سے گزرے اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو علی القوائم قطع کرے۔

(۱۰) ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے اور دو دیے ہوئے دائروں کو علی القوائم قطع کرے۔

(۱۱) (و) اور (و) دو دیے ہوئے دائرے ہیں نقطہ ط اس طرح حرکت کرتا ہے کہ ط سے دائروں (و) اور (و) تک کھینچے ہوئے تماسوں کے مربعوں کا فرق مستقل ہے۔ ثابت کرو کہ ط کا طریق ایک خط مستقیم ہے جو دیے ہوئے دائروں کے بنیادی محور کے متوازی ہے۔

پانچواں باب

دائرؤں کا بنانا

۶۸۔ تین شرائط کے دیے جانے پر ایک دائرہ بنایا جاسکتا ہے۔ مثلاً
(۱) تین دیے ہوئے نقطوں میں سے جو ایک خط مستقیم میں نہیں ہیں ایک دائرہ
کھینچ سکتا ہے (۲) ایک دائرہ کھینچ سکتا ہے جس کا نصف قطر دیا ہوا ہو اور جو ایک
دیے ہوئے خط (یا دائرہ) کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرے۔

۶۹۔ دو شرائط کو پورا کرنے والے دائرؤں کے مرکزوں کے طریق کے
متعلق مندرجہ ذیل اہم نتائج سے طالب علم پہلے ہی سے واقف ہوگا۔

(۱) اس دائرہ کے مرکز کا طریق جس کا نصف قطر معلوم ہو اور جو ایک
دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے ایک دائرہ ہے جس کا مرکز دیے ہوئے
نقطہ پر ہے۔

(۲) اس دائرہ کے مرکز کا طریق جو دیے ہوئے نقطوں میں سے
گزرے دیے ہوئے نقطوں کو ملانے والے خط مستقیم کا عمودی منصف ہے۔

(۳) اس دائرہ کے مرکز کا طریق جو دیے ہوئے متقاطع خطوط کو مس
کرے ان خطوط کے درمیانی زاویوں کے منصف ہیں۔

(۴) ایک دیے ہوئے خط کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرنے والے
دائرہ کے مرکز کا طریق ایک خط ہے جو نقطہ مذکور میں سے گزرتا ہے اور
دیے ہوئے خط پر عمود ہے۔

(۵) ایک دیے ہوئے دائرہ کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرنے والے دائرہ کے مرکز کا طریق دیے ہوئے نقطہ کو دائرہ کے مرکز سے ملانے والا خط ہے۔
 (۶) ایک ایسے دائرہ کے مرکز کا طریق جس کا نصف قطر معلوم ہے اور جو ایک دیے ہوئے خط کو مس کرتا ہے دیے ہوئے خط کے متوازی خطوط کا ایک جوڑا ہے۔

(۷) ایک ایسے دائرہ کے مرکز کا طریق جس کا نصف قطر معلوم ہے اور جو ایک دیے ہوئے دائرہ کو مس کرتا ہے دیے ہوئے دائرہ کے ساتھ ہم مرکز دائروں کا ایک جوڑا ہے۔

امثلہ ۱۸

(۱) ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے اور ایک دیے ہوئے خط کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرے۔
 (۲) دیے ہوئے نصف قطر والا ایک دائرہ کھینچو جو دو معلوم نقطوں میں سے گزرے۔


(۳) دیے ہوئے نصف قطر والا دائرہ کھینچو جو دو دیے ہوئے خطوں (یا دائروں) کو مس کرے۔ اس سوال کے کتنے حل ہیں؟
 (۴) دیے ہوئے نصف قطر والا ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے اور ایک دیے ہوئے خط کو یا ایک دیے ہوئے دائرہ کو مس کرے۔

(۵) ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرے۔

۷۔ مسئلہ عملی۔ ایک دائرہ کھینچنا جو ایک دیے ہوئے دائرہ

(ج) کو مس کرے اور ایک دیے ہوئے خط مستقیم لاہا کو ایک دیے ہوئے نقطہ پر مس کرے۔

تحلیل - فرض کرو کہ دائرہ (م) مطلوبہ دائرہ ہے اور یہ دیے ہوئے
دائرہ (ج) کو نقطہ ت پر مس کرتا ہے۔



فرض کرو کہ ن ت دائرہ (ج) سے مکر نقطہ ف پر ملتا ہے۔

ج ف، ج ت، م ت اور م ن کو ملاؤ۔

مثلث متساوی الساقین م ن ت میں

(۱) $م ن ت = م ت ن$

نیز مثلث متساوی الساقین ج ت ف میں

(۲) $ج ف ت = ج ت ف$

لیکن چونکہ دائرہ (م) دائرہ (ج) کو نقطہ ت پر مس کرتا ہے

اس لیے م ت ج خط مستقیم ہے

(۳) $م ت ن = ج ت ف$

نتائج (۱)، (۲)، (۳) کو ملائے سے حاصل ہوتا ہے کہ

$م ن ت = ج ف ت$


اس لیے ج ف // م ن

اب چونکہ دائرہ (م) خط لاما کو نقطہ ن پر مس کرتا ہے
 اس لیے م ن عمود ہے لاما پر
 اس لیے ج ف بھی عمود ہے لاما پر
 پس اگر دیے ہوئے دائرہ کے مرکز ج سے دیے ہوئے خط لاما پر عمود
 کھینچا جائے تو اس عمود اور دائرہ (ج) کے نقطہ تقاطع سے نقطہ ف حاصل
 ہوتا ہے اور ف ن اور دائرہ (ج) کا نقطہ تقاطع مت مطلوبہ نقطہ تماس ہے
 اور ج م اور ن م کے تقاطع سے مطلوبہ دائرہ کا مرکز م حاصل ہوتا ہے۔
 اس تحلیل کی بناء پر طالب علم اس عملی مسئلہ کا حل مع ثبوت خود بہم پہنچائے۔
 منفی ٹ۔ وہ خط جو ج میں سے گزرتا ہے اور لاما پر عمود ہے دائرہ (ج) کو
 ایک اور نقطہ ف پر بھی کاٹتا ہے جس کی مدد سے دیے ہوئے شرائط کو پورا کرنے والا
 ایک اور دائرہ بھی کھینچ سکتا ہے۔

تفصیل۔ مندرجہ بالا طریقہ آسانی ذیل کے عملی مسئلہ کے حل کے طریقہ کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے۔

مسئلہ عملی۔ ایک دائرہ کھینچنا جو ایک دیے ہوئے دائرہ (ج) کو
 ایک دیے ہوئے نقطہ ن پر مس کرے اور ایک دیے ہوئے خط لاما کو بھی
 مس کرے۔

اس عملی مسئلہ کا حل مع ثبوت طالب علم خود بطور مشق کے بہم پہنچائے۔
مسئلہ عملی۔ ایک دائرہ کھینچنا جو ایک دیے ہوئے خط لاما کو



مس کرے اور دو دیے ہوئے نقطوں ۱۱ اور ب میں سے جو لاہا کی ایک ہی جانب واقع ہوں گزرے۔

تخلیل۔ فرض کرو کہ مطلوبہ دائرہ دیے ہوئے خط لاہا کو نقطہ ت پر مس کرتا ہے۔ نیز فرض کرو کہ خط ب ا دیے ہوئے خط لاہا کو نقطہ و پر قطع کرتا ہے۔


تب $وت = وا \times وب$ جو معلوم ہے

اس لیے $وت$ معلوم ہو سکتا ہے اور اس کی مدد سے دیے ہوئے خط لاہا اور مطلوبہ دائرہ کا نقطہ تماس ت حاصل ہوتا ہے۔ پس دائرہ اب ت مطلوبہ دائرہ ہے۔
نوٹ۔ چونکہ خط لاہا پر و کی دوسری جانب ایک اور نقطہ ت بھی آیا لیا جاسکتا ہے کہ $وت = و$ اس لیے ایک اور دائرہ اب ت کھینچ سکتا ہے جو دیے ہوئے شرائط کو پورا کرتا ہے۔

طالب علم اس تحلیل کی بنا پر عمل حاصل کرے اور ثبوت بہم پہنچائے۔

مسئلہ عملی۔ ایک دائرہ کھینچنا جو دو دیے ہوئے متقاطع خطوط

وا و ب کو مس کرے اور ایک دیے ہوئے نقطہ ن میں سے گزرے۔



تخلیل۔ فرض کرو کہ مطلوبہ دائرہ (م) ہے۔ چونکہ دائرہ (م) خطوط وا

اور وہ کوس کرتا ہے، اس لیے اس کا مرکز ان خطوط کے درمیانی زاویہ کے منصف پر ہے۔

ن سے و م پر عمود نکالو اور اس کو اتنا خارج کرو کہ وہ دائرہ (م) مکرر پر ملے۔

تب $ن ع = ع ن$ ۔ پس $ن$ معلوم ہو سکتا ہے۔

اور مطلوبہ دائرہ وہ دائرہ ہے جو نقطوں $ن$ اور $ن$ میں سے گزرتا ہے اور دیے ہوئے خطوط میں سے کسی ایک کو مس کرتا ہے۔


نقشہ (۱) چونکہ دو ایسے دائرے کھینچ سکتے ہیں جو $ن$ اور $ن$ میں سے گزرتے ہیں اور دیے ہوئے خطوط میں سے ایک کو مس کرتے ہیں، اس لیے اس عملی مسئلہ کے دو حل ہیں۔

نقشہ (۲) اس صورت پر غور کرو جبکہ دیے ہوئے خط متوازی ہوں۔

نقشہ (۳)۔ اگر دیا ہوا نقطہ $ن$ منصف $و م$ پر ہو تو عمل کی تشریح کرو۔

۳۔ مسئلہ عملی۔ ایک دائرہ کھینچنا جو ایک دیے ہوئے دائرہ

(ج) کو مس کرے اور دو دیے ہوئے نقطوں $ا$ اور $ب$ میں سے گزرے۔



تخلیل - فرض کرو کہ مطلوبہ دائرہ (م) ہے جو دیے ہوئے دائرہ (ج) کو تیرس کرتا ہے۔ فرض کرو کہ اس پر ان دائروں کا مشترک مماس خط ا ب سے وپر ملتا ہے۔

اب اگر وہیں سے گزرنے والا کوئی خط دائرہ (ج) سے ف اور ق پر ملے تو $وف \times وق = و ت \times و ب$

پس معلوم ہوا کہ ا، ب، ف، ق مشترک المحيط نقطے ہیں۔
ترکیب - مندرجہ بالا تحلیل کی بنا پر مطلوبہ دائرہ کھینچنے کا عمل حربہ ذیل حاصل ہوتا ہے۔

کوئی دائرہ کھینچو جو ا اور ب میں سے گزرنے اور دیے ہوئے دائرہ (ج) کو ف اور ق پر قطع کرے۔ اب اور ف ق کے نقطہ تقاطع میں سے دیے ہوئے دائرہ (ج) کا مماس و ت کھینچو۔

تب ا، ب، ت میں سے گزرنے والا دائرہ دیے ہوئے شرائط کو پورا کرتا ہے۔ طالب علم اس کا ثبوت خود بہم پہنچائے۔

نوٹ (۱) - و سے دائرہ (ج) کا ایک اور مماس و ت بھی کھینچ سکتا ہے اس لئے ایک اور دائرہ ا ب ت بھی حاصل ہوتا ہے جو دیے ہوئے شرائط کو پورا کرتا ہے۔

نوٹ (۲) - ظاہر ہے کہ اس عملی مسئلہ کا حل صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کہ دیے ہوئے نقطے ا اور ب دونوں دائرہ (ج) کے اندر ہوں یا دونوں باہر۔ اگر ایک نقطہ اندر ہو اور دوسرا باہر تو دیے ہوئے شرائط کو پورا کرنے والا دائرہ کھینچنا ناممکن ہے۔

۱۹۔ مسئلہ

(۱) ایک رُبع دائرہ کے اندر جس کا نصف قطر سمر ہے ایک دائرہ بناؤ۔ اور اس دائرہ کا نصف قطر محسوب کرو [جواب ۴ (۳۱-۱) ایچ]

(۲) ایک دائرہ کھینچو جو حوالہ کے دونوں (علی القوائم) محوروں کو مس کرے اور نقطہ (م) میں سے گزرنے والا دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ ان دائروں کے


نصف قطر محبوب کرو۔ [جواب :- (۳۴ = ۱۶) انج]

(۳) ایک مساوی الاضلاع مثلث کے اندر تین دائرے بناؤ جن میں سے ہر ایک مثلث کے دو ضلعوں اور باقی دو دائروں کو مس کرے۔ دائرہ کے نصف قطر کا طول مثلث کے ضلع کے طول کی رقوم میں حاصل کرو۔ [جواب ۳۴ - ۱ = ۳۳]

(۴) ۵ سمر نصف قطر والے دائرے کے اندر تین دائرے بناؤ جن میں سے ہر ایک دیے ہوئے دائرہ کو اور نیز باقی دو دائروں کو مس کرے۔ اگر ان تین دائروں میں سے ایک کا نصف قطر ۵ سمر ہو تو ثابت کرو کہ $[۱ + ۴۰ قہ] = ۵$

(۵) ایک دائرہ کھینچو جو دو دیے ہوئے خطوط کو مس کرے اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو مس کرے۔

(۶) ایک دائرہ کھینچو جو دو دیے ہوئے دائروں (۱) اور (۲) کو خارجاً مس کرے اور ایک دیے ہوئے نقطہ (ن) میں سے (جو دائروں کے باہر ہے) گزرے۔



[تخلیل - فرض کرو کہ مطلوبہ دائرہ (۴) ہے جو دیے ہوئے دائروں کو

ت اور ق پر ماس کرتا ہے۔ خط ف ق مرکزوں کے خط و و سے سیدھی مشابہت کے مرکز ش پر ملتا ہے (دیکھو مسئلہ ۱۴ سوال ۳)۔ فرض کرو کہ دیے ہوئے دائروں کا ایک راست مشترک ماس ت ت ہے یہ ماس سیدھی مشابہت کے مرکز ش میں سے گزرتا ہے۔

اور ش ف x ش ق = ش ت x ش ت (دیکھو مسئلہ ۱۴ سوال ۴)

فرض کرو کہ ش ن مطلوبہ دائرہ سے مکرر ن پر ملتا ہے۔

تب ش ن x ش ن = ش ف x ش ق = ش ت x ش ت۔ اس لیے ن ت ت ن مشترک المحيط ہیں۔ اس بنا پر نقطہ ن معلوم ہو سکتا ہے پس وہ دائرہ جو معلوم نقطوں ن اور ن میں سے گزرتا ہے اور دیے ہوئے دائروں میں سے کسی ایک سے کو خارجاً مس کرتا ہے دیے ہوئے شرائط کو پورا کرتا ہے۔

(۷) سوال بالاکی مدد سے ایک دائرہ کھینچو جو تین دیے ہوئے دائروں کو خارجاً مس کرے۔

(۸) ایک دائرہ کھینچو جو ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزے، ایک دیے ہوئے دائرہ کو مس کرے اور ایک دیے ہوئے دائرہ کو علی القوائم قطع کرے۔

(۹) ایک دائرہ کھینچو جس کا مرکز ایک دیے ہوئے خط پر ہو جو ایک دیے ہوئے دائرہ کو مس کرے اور ایک دیے ہوئے نقطہ میں سے گزرے۔


چھٹا باب

اعظم اقل

۱۔ جب کوئی ہندسی مقدار دیے ہوئے شرائط کے ماتحت مسلسل طور پر بدلتی ہے تو بعض اوقات یہ دریافت کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ آیا اس تبدیلی کے دوران میں کوئی ایسے مقام ہیں جہاں یہ مقدار بڑھتے بڑھتے گھٹنا شروع ہوتی ہے یا گھٹتے گھٹتے بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اگر ایسے مقام ہوں تو اول الذکر نوعیت کے مقام کے لیے متغیر مقدار کی قیمت کو اعظم قیمت اور آخر الذکر نوعیت کے مقام کے لیے اس کی قیمت کو اقل قیمت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر کسی متغیر مقدار کی قیمت کسی خاص مقام پر اعظم ہے تو اس مقام کے عین قرب میں متغیر مقدار کی تمام قیمتوں سے اعظم قیمت بڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر متغیر مقدار کی قیمت کسی خاص مقام پر اقل ہے تو اس مقام کے عین قرب میں متغیر مقدار کی تمام قیمتوں سے اقل قیمت چھوٹی ہوگی۔

صفحہ ۱۱۴ پر کی شکل میں نقطہ ن کے معین کی تبدیلی پر غور کرو جب کہ نقطہ ن منحنی پر حرکت کرے۔ مقام ن پر معین کا طول اعظم ہے کیونکہ اس مقام پر معین کی قیمت قرب و جوار کی تمام قیمتوں سے بڑی ہے اور اسی طرح ن پر بھی معین اعظم ہے۔ نیز ن اور ن پر معین اقل ہے۔ واضح رہے کہ بالعموم اعظم قیمت سے مراد بڑی سے بڑی قیمت

نہیں ہوتی ہے۔



مثلاً شکل بالا میں N پر معین اعظم ہے لیکن یہ قیمت معین کی قیمتوں میں سب سے بڑی نہیں ہے۔ چنانچہ N پر کا معین جو اقل ہے N پر کے معین سے جو اعظم ہے بڑا ہے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ اقل قیمت متغیر مقدار کی چھوٹی سے چھوٹی قیمت ہو۔

اس باب میں ہم صرف ایسی تبدیلیوں پر غور کریں گے جن میں متغیر مقدار صرف ایک مرتبہ اعظم یا اقل قیمت اختیار کرتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اعظم قیمت درحقیقت بڑی سے بڑی قیمت ہے اور اقل قیمت چھوٹی سے چھوٹی۔
۵۔ بالعموم اعظم یا اقل قیمتوں کی تحقیق میں مندرجہ ذیل اشارے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔


(۱) مقدار متغیر کی دو مساوی قیمتوں کے درمیان کم از کم ایک اعظم یا اقل قیمت ہوگی جو شکل بالا سے واضح ہے۔
علاؤ مقدار متغیر کی اعظم یا اقل قیمت یہ فرض کرنے سے دریافت کی جاتی ہے کہ

اس مقام کے مخالف جانب قریب کے دو مقامات کے لیے متغیر مقدار کی قیمتیں مساوی ہیں اور بالآخر یہ مساوی قیمتیں اعظم یا اقل قیمت پر منطبق ہو جاتی ہیں۔

(۲) عموماً مقام شکل پر اعظم یا اقل قیمت واقع ہوتی ہے۔
۴۔ مسئلہ۔ اگر ایک مثلث کے دو ضلع دیے ہوئے ہوں تو مثلث

کا رقبہ اعظم ہو گا جب کہ ان ضلعوں کا درمیانی زاویہ قائمہ ہو۔

فرض کرو کہ مثلث ABC کے اضلاع AB ، AC دیے گئے ہیں۔
نیز فرض کرو کہ ضلع AB کا مقام ثابت ہے۔ تب AC کا طریق ایک دائرہ ہے جس کا مرکز A ہے اور جس کا نصف قطر دیے ہوئے ضلع AC کا طول ہے۔



فرض کرو کہ اس کے مقام AC کے لیے مثلث ABC کا رقبہ اعظم ہے۔
اس مقام کے مخالف جانب AC کے طریق پر دو قریب کے نقطے C اور C' ایسے لو کہ مثلثات ABC اور ABC' کے رقبے مساوی ہوں۔ تب CC' // AB کے
جب C اور C' دونوں ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں تو AC سے
گزرنے والا خط نقطہ C پر کا ماس ہو گا اس لیے اگر AC کا رقبہ اعظم ہے
تو C پر دائرہ (۱) کا ماس قاعدہ AB کے متوازی ہو گا۔


یعنی ج ا ب = قائمہ زاویہ یہی ثابت کرنا تھا۔

نوٹ - $\Delta = \frac{1}{2}$ ب ج جب ا میں ب، ج مستقل ہیں۔ اس لیے Δ اعظم ہوگا جبکہ جب ا اعظم ہو۔

یعنی ا = 90° اور اعظم رقبہ = $\frac{1}{2}$ ب ج

۷۷۔ مسئلہ - ایک دیے ہوئے دائرہ (و) کے اندر کے ایک

ثابت نقطہ ن میں گزرنے والے تمام وتروں میں اس وتر کا طول اقل ہوتا ہے جس کی تنصیف نقطہ ن پر ہوتی ہے۔



فرض کرو کہ وتر ا ن ب کا طول اقل ہے۔

نیز فرض کرو کہ اس کے مخالف جانب دو قریب کے اور مساوی طول والے

وتر ا ن ب، ا م ن ب ہیں۔

چونکہ ا ب = ا م ب م

اس لیے قطعہ ا م ب کا رقبہ = قطعہ ا م ب کا رقبہ

یعنی Δ ا ن ا م = Δ ب م ن ب م [کیونکہ ن ا، ن ا م اور قوس


ا م سے گھرا ہوا رقبہ تقریباً مساوی ہے Δ ن ا، ا م کے رقبہ کے]۔

لیکن ان مثلثات کے مشترک راس ن پر کے زاویے مساوی ہیں

اس لیے ن ا، ن ا م = ن ب م ن ب م

انہما میں نقاط ا اور ام دونوں ا پر منطبق ہوتے ہیں اور ب اور ب^۱ دونوں ب پر

اس لیے $ان = ب^۱ = ن$ یعنی $ان = ا = ن$ ب یعنی اقل وتر ا ب کی تنصیف دیے ہوئے نقطہ ن پر ہوتی ہے۔ یہی ثابت کرنا تھا۔
نوٹ۔ اس مسئلہ کو ذیل کے طریقہ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔




فرض کرو کہ ا ب کوئی وتر ہے جو ن میں سے گزرتا ہے۔ مرکز و سے ا ب پر عمود و ع نکالو۔

تب $ا ب = ۲ \times ا ع = ۲ \times ۲ = ۴$ ۔ و ع ا جہاں دائرہ کا نصف قطر ہے۔ نیز قائمہ الزاویہ Δ و ع ن سے ظاہر ہے کہ و ع $>$ و ن اس لیے و ع کی بڑی سے بڑی قیمت اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ ا ب کا وسطی نقطہ ع دیے ہوئے نقطہ ن پر منطبق ہو۔ اور اس صورت میں $۲ \times ا ع = ۴$ ۔ و ع ا کی قیمت یعنی ا ب کی قیمت اقل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ا ب کا طول اقل ہوتا ہے جبکہ ا ب کا وسطی نقطہ ن ہو۔

مشق۔ شکل بالا میں ثابت کرو کہ وتر ا ن ب دائرہ سے اقل رقبہ والا قطعہ صغیر اور اعظم رقبہ والا قطعہ کبیر قطع کرتا ہے۔

۸۔ دو متقاطع خطوط ا ب، ا ج دیے گئے ہیں۔ اور ب ا ج کے اندر ایک ثابت نقطہ ن ہے۔ اگر ن میں سے گزرنے والا کوئی خط خطوط ا ب، ا ج سے ف اور ق پر ملے تو مثلث ف ا ق کا رقبہ اقل ہوگا جبکہ ف ق کی تنصیف ن پر ہو۔

فرض کرو کہ Δ ا ف ق کا رقبہ اقل ہے۔ فرض کرو کہ ف ق کے




مخالف جانب ن میں سے گزرنے والے دو قریب کے خط ف ن ق اور
ف ن ق ایسے ہیں کہ مثلث ف ا ق کا رقبہ = مثلث ف ا ق کا رقبہ
تب مثلث ف ن ق = مثلث ق ن ق اور ان مثلثات کے
مشترک رأس ن پر کے زاویے مساوی ہیں۔

اس لیے $ف ن \times ق ن = ف ن \times ق ن$ اور انہما میں جب
ف ق اور ف ق دونوں خط ف ق پر منطبق ہوتے ہیں تو
ن ق = ن ق یعنی ن ق = ن ق۔ یہی ثابت کرنا تھا۔

۹۔ ذیل میں اعظم اقل قیمتوں کی تحقیق کے خالص ہندی طریقوں کی
تشریح کی جائیگی۔

مسئلہ۔ اگر ایک لامحدود خط ج د کی ایک ہی جانب کے دو ثابت
نقطوں ا اور ب کو خط پر کے کسی نقطہ ن سے ملایا جائے تو ان اور ب ن
کا مجموعہ اقل ہوگا جبکہ یہ خطوط دیے ہوئے خط ج د کے ساتھ مساوی زاویے

۱ سے ج د پر عمود ا ع نکالو اور ا ع محدودہ پر نقطہ ا ایسا لکھ ا ع = ع ا




واقع ہوں اور ج د پر کوئی نقطہ نہ ہو تو ثابت کرو کہ ان سب بن اعظم ہو گا

جبکہ یہ خط دیے ہوئے خط ج د سے مساوی زاویے بنائیں۔

۴۰۔ مسئلہ۔ ایک لامحدود ثنائیت خط ج د کی ایک ہی جانب

دو ثابت نقطے اور ب ہوں اور خط ج د پر کوئی متحرک نقطہ ن ہو تو ا ن ب اعظم ہوگا جبکہ دائرہ ا ن ب دیے ہوئے خط ج د کو مس کرے۔



ایک دائرہ کھینچو جو اب میں سے گزرے اور ج ڈ کو مس کرے۔ فرض کرو کہ نقطہ تماس N ہے۔

ج د پیر کوئی دوسرا نقطہ نہ ہو۔

ثابت کرنا ہے کہ $\hat{A} \hat{B} \hat{A}$ بڑا ہے $\hat{A} \hat{B}$ سے

فرض کرو کہ ان دائرہ کو ف پر قطع کرتا ہے۔

ف م کو ملاؤ۔

اَن ب = ا ف ب جو بڑا ہے ا ن ب سے۔ یہی ثابت کرنا تھا۔

فیٹ۔ ا' ب میں سے گزرنے والے اور خط ج د کو مس کرنے والے دو

دائرے کھینچ سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ دوسرا دائرہ خط جہ کو نہ پیرس کرتا ہے اس صورت

میں بھی اثباتِ اعظم ہوگا۔ پس اثباتِ ب کی دو اعظم قیمتیں ہیں جو ان کے مقامات

ن اور ن کے لیے حاصل ہوتی ہیں واضح ہو کہ بالعموم یہ دو قیمتیں مساوی نہ ہوں گی۔
اگر ب ا ج د سے لا پرے تو متحرک نقطہ ن کے مقام لا کے لیے ا ن ب
کی قیمت صفر ہے جو زاویہ ا ن ب کی اقل قیمت ہے۔
پس ضمناً معلوم ہوا کہ دو اعظم قیمتوں کے درمیان کم از کم ایک اقل
قیمت واقع ہوتی ہے۔

۸۱۔ ذیل میں اعظم اقل قیمتوں کی تحقیق کے چند ایسے مسائل درج
کیے جاتے ہیں جو جبریہ متاثرات کی مدد سے باسانی حاصل ہوئے ہیں۔
مسئلہ۔ اگر ایک دیے ہوئے محدود خط ا ب پر کوئی نقطہ ن
ہو تو ا ن x ن ب اعظم ہوگا جبکہ ن وسطی نقطہ ہو ا ب کا۔

فرض کرو کہ ا ن = لا اور ن ب = ما

از روئے سوال لا + ما مستقل ہے

اب ذیل کے متماثلہ پر غور کرو $م لا = (لا + ما) - (لا - ما)$
ہمیں لا + ما کی اعظم قیمت معلوم کرنا ہے اس صورت میں م لا بھی اعظم ہوگا۔
چونکہ اوپر کے متماثلہ میں $(لا + ما)$ مستقل ہے اس لیے م لا اعظم ہوگا
جبکہ $(لا - ما)$ (جو منفی نہیں ہو سکتا) اپنی چھوٹی سے چھوٹی قیمت یعنی قیمت
صفر اختیار کرے۔

یعنی جبکہ لا = ما

یعنی ا ن = ن ب یہی ثابت کرنا تھا۔

۸۲۔ **مسئلہ**۔ اگر ایک دیے ہوئے محدود خط ا ب پر کوئی
نقطہ ن ہو تو ا ن + ن ب اقل ہوگا جبکہ ن وسطی نقطہ ہو ا ب کا۔
فرض کرو کہ ا ن = لا اور ن ب = ما
از روئے سوال لا + ما مستقل ہے
اب ذیل کے متماثلہ پر غور کرو۔

$$۲ (لا + ما) = (لا + ما) + (لا - ما)$$

بائیں جانب میں $(لا + ما)$ مستقل ہے اور $(لا - ما)$ منفی نہیں ہو سکتا ہے

اس لیے ۲ (لا + ما) کی قیمت چھوٹی سے چھوٹی ہوگی جبکہ بائیں جانب کی دوسری رقم (لا - ما) اپنی چھوٹی سے چھوٹی قیمت صفر اختیار کرے یعنی جبکہ لا = ما

یعنی ان = ن با جو ثابت کرنا تھا۔

مسئلہ ۲۰

(۱) ایک دیے ہوئے ثابت نقطہ سے ایک دیے ہوئے ثابت خط تک خطوط کھینچے گئے ہیں ثابت کرو کہ ان خطوط میں سے سب سے چھوٹا خط وہ ہے جو دیے ہوئے خط پر عمود ہے۔

(۲) ایک دیے ہوئے نقطہ سے ایک دیے ہوئے دائرہ کے محیط تک کھینچے ہوئے خطوط میں سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے وہ خط ہیں جو دائرہ کے مرکز میں سے گزرتے ہیں۔

(۳) ثابت کرو کہ دائرہ کا بڑے سے بڑا وتر اس کا قطر ہے۔

(۴) مستقل محیط والے مستطیلوں میں سب سے بڑے رقبہ والا مستطیل مربع ہے۔

(۵) ایک مثلث کا قاعدہ اور اسی زاویہ معلوم ہیں۔ ثابت کرو کہ مثلث کا رقبہ اعظم ہوگا جبکہ مثلث متساوی الساقین ہو۔


(۶) مستقل رقبہ والے مستطیلوں میں سب سے چھوٹے احاطہ والا مستطیل مربع ہے۔

(۷) مستقل رقبہ والے مستطیلوں میں سب سے چھوٹے وتر والا مستطیل مربع ہے۔

(۸) ثابت کرو کہ ان سب مثلثوں میں جن کا قاعدہ اور رقبہ معلوم ہے مثلث متساوی الساقین کا محیط اقل ہے۔

(۹) دو سیدھی پٹریاں ایک دوسرے پر علی القوائم ہیں اور ایک سیدھی سلاخ ان کے درمیان پھسلتی ہے بتاؤ کہ پھسلنے والی سلاخ کے کس مقام کے لیے

پٹریوں اور سلاخ سے بننے والے مثلث کا رقبہ عظم ہے۔
 (۱۰) ثابت کرو کہ ایک دیے ہوئے دائرہ کے اندر بنے ہوئے
 مثلثوں میں سب سے بڑے رقبہ والا مثلث مساوی الاضلاع ہے۔
حل۔ فرض کرو کہ دیے ہوئے دائرہ (و) کے اندر بنا ہوا کوئی مثلث
 اب ج ہے جو مساوی الاضلاع نہیں ہے۔ فرض کرو کہ اب \neq ج -



تب رأس ا کو قوس ب ج کے وسطی نقطہ آ پر لینے سے دائرہ کے اندر
 بنا ہوا Δ اب ج حاصل ہوتا ہے جس کا رقبہ بڑا ہے Δ اب ج کے
 رقبہ سے۔ یعنی دائرہ کے اندر بنے ہوئے مثلث کے رقبہ میں اضافہ ممکن ہے
 اگر مثلث مساوی الاضلاع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دائرہ کے اندر
 بنے ہوئے مثلثوں میں عظم رقبہ والا مثلث مساوی الاضلاع ہے۔

نوٹ۔ مندرجہ بالا استدلال میں دائرہ کے اندر بنے ہوئے مساوی الاضلاع
 مثلث کے رقبہ کا مقابلہ دائرہ کے اندر بنے ہوئے ایسے مثلث سے جو مساوی الاضلاع
 نہ ہو نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مثلث کے رقبہ میں اضافہ ممکن ہے اگر
 مثلث مساوی الاضلاع نہ ہو۔

یہ نہایت ضروری ہے کہ اس استدلال کی نوعیت کو طالب علم اچھی طرح سمجھے۔
 (۱۱) ایک پل کی تین گمانیں ہیں جن میں سے ہر ایک کا عرض ۵ فٹ
 ہے۔ بتاؤ کہ پل سے کتنے فاصلہ پر کسی ایک کنارے پر وہ نقطہ ہے جہاں
 درمیانی کمان کے محاذی عظم زاوید بنتا ہے [جواب ۵.۴۴ فٹ]

(۱۲) ان تمام مثلثوں میں جو ایک دیے ہوئے دائرہ کے اندر

بن سکتے ہیں مثلث مساوی الاضلاع کا محیط اعظم ہے۔
(۱۳) اُن تمام مثلثوں میں جو ایک مثلث کے اندر بن سکتے ہیں مثلث پائین کا احاطہ اقل ہے۔

(۱۴) ایک مثلث کا قاعدہ اور راسی زاویہ معلوم ہیں ثابت کرو کہ مثلث کے باقی دو ضلعوں پر کے مربعوں پر کا مجموعہ اعظم ہوگا جبکہ مثلث مساوی الساقین ہو۔
(۱۵) ایک دائرہ کے باہر دو نقطے A اور B ہیں اور دائرہ پر کوئی نقطہ N ہے ثابت کرو کہ $AN + BN$ اقل ہوگا جبکہ یہ خطوط N پر کے مماس کے ساتھ مساوی زاویے بنائیں۔

(۱۶) مثال بالا کی مدد سے ایک دیے ہوئے مثلث ABC (جس کے سب زاویے حادہ ہیں) کے اندر ایک نقطہ N ایسا معلوم کرو کہ $AN + BN + CN$ اقل ہو۔

(۱۷) ایک ذواربعتہ الاضلاع کے چاروں ضلعے بلحاظ طول اور ترتیب دیے گئے ہیں، ثابت کرو کہ ذواربعتہ الاضلاع کا رقبہ اعظم ہوگا جبکہ ذواربعتہ الاضلاع مشترک المحيط ہو۔

ساتواں باب

چلیبی نسبت موسیقی صفا اور موسیقی منیل

(۸۳) جدید علم ہند میں ایک خط مستقیم پر طولوں کی پیمائش میں سمت پیمائش کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک سمت میں ناپے ہوئے فاصلوں کو مثبت قرار دیا جائے تو مخالف سمت میں ناپے ہوئے فاصلوں کو منفی قرار دیا جائیگا۔ پس اگر خط پر ۱ اور ۲ دو نقطے ہوں تو $ا ب = - ب ا$ اور $ب ا = ا ب$ جس سے حاصل ہوتا ہے کہ $ا ب + ب ا = ۰$ ۔ اگر ایک خط مستقیم پر تین نقطے ۱، ۲، ۳ ہوں تو

$$ا ب + ب ج = ا ج \quad اور \quad ا ب + ب ج + ج ا = ۰$$


نیز اگر دو نقطوں ۱ اور ۲ میں سے گزرنے والے خط پر کوئی نقطہ ۳ ہو تو $و ب = ۱ ا$

ب ————— و

ب ————— و

و ————— ب

۸۴۔ مسئلہ۔ اگر خط مستقیم کا وسطی نقطہ م ہو اور خط پر کوئی نقطہ
و ہو تو ۲ و م = و ا + و ب




ثبوت۔ چونکہ ا م = م ب
اس لیے و م - و ا = و ب - و م
اس لیے ۲ و م = و ا + و ب

۸۵۔ تعریف۔ متقدوم خط نقطوں کو نقطوں کی صف

کہتے ہیں۔ مسئلہ۔ اگر ا ب ج د چار نقطوں کی ایک صف ہو تو

$$ا ب \times ج د + ب ج \times ا د + ج ا \times ب د = ۰$$



$$ا ب \times ج د + ب ج \times ا د + ج ا \times ب د$$

$$= ا ب (ا د - ا ج) + (ا ج - ا ب) ا د - ا ج (ا ب - ا د) + (ا ب - ا د) ا ج = ۰$$

نوٹ۔ یہ مسئلہ درست ہے خواہ ا ب ج د ایک خط پر کسی ترتیب میں لیے جائیں۔


۸۶۔ تعریف۔ اگر ا ب ج د چار نقطوں کی ایک صف ہو تو

نسبت $\frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب}$ کو صف ا ب ج د کی چلیمی نسبت کہتے ہیں اور

اس کی قیمت کو علامت (ا ب ج د) سے تعبیر کرتے ہیں۔

نوٹ۔ صف ا ب ج د کی چلیمی نسبت کو لکھنے اور یاد رکھنے کے لئے

ایک دائرہ پر نقاط ا ب ج د کو سلسلہ وار سمت ساعت میں لکھو۔ شمار کنندہ
حاصل کرنے کے لیے ا سے شروع کر کے حروف کو سمت ساعت میں لکھو



اور نسب نما حاصل کرنے کے لیے ا سے شروع کر کے حروف کو مخالف سمت ساعت میں لکھو۔
۸۷۔ مسئلہ۔ اگر (ا ب ج د) = (ا ب ج ع) تو نقاط د اور

ع ایک دوسرے پر منطبق ہونگے۔

چونکہ (ا ب ج د) = (ا ب ج ع)

$$\therefore \frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب} = \frac{ا ب \times ج ع}{ا ع \times ج ب}$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{ج د}{ا د} = \frac{ج ع}{ا ع}$$

$$\text{یعنی} \quad \frac{ج د}{ا د} = \frac{ج ع}{ا ع}$$

یعنی ج ا کی تقسیم ایک ہی نسبت میں نقاط د اور ع پر ہوتی ہے
 اس لیے ضروری ہے کہ د اور ع ایک دوسرے پر منطبق ہوں۔

۸۸۔ مسئلہ

(۱) ا ب کا وسطی نقطہ ج ہے اور ا ب پر کوئی اور نقطہ
 ن ہے، ثابت کرو کہ

$$(۱) \text{ ان } \times \text{ بن } + \text{ ج } \times \text{ با } = \text{ ج } \times \text{ ن}$$

$$(ب) \text{ ابا } + \text{ بان } = \text{ ا } \times \text{ اج } + \text{ ج } \times \text{ ن}$$

(۲) اب کا وسطی نقطہ ج ہے اور اب محدودہ پر کوئی نقطہ د ہے
ثابت کرو کہ $\text{اج} \times \text{اد} = \text{ج} \times \text{با} + \text{د} \times \text{اب}$

(۳) 'ا' 'ب' 'ج' 'ن' کوئی چار ہم خط نقطے ہیں۔ ثابت کرو کہ

$$\text{ن} \times \text{اج} + \text{ن} \times \text{با} + \text{ج} \times \text{ان} + \text{ا} \times \text{اب} + \text{ب} \times \text{اج} + \text{ا} \times \text{اب} = ۰$$

(۴) اگر $(\text{اب ج د}) = ۱$ تو

ثابت کرو کہ (اب ج د) کی قیمت نہیں بدلتی جبکہ کسی دو حروف کو باہم بدلا جائے اور ساتھ ہی باقی دو حروف کو بھی باہم بدلا جائے یعنی

$$(\text{اب ج د}) = (\text{با اد ج}) = (\text{ج د اب}) = (\text{د ج با}) = ۱$$

(۵) ثابت کرو کہ پہلے اور تیسرے حروف کو باہم بدلنے سے یا دوسرے اور چوتھے حروف کو باہم بدلنے سے چلیبی نسبت کی قیمت الٹ جاتی ہے یعنی

$$(\text{ا د ج ب}) = (\text{ب ج د ا}) = (\text{ج ب ا د}) = (\text{د ا ب ج}) = \frac{۱}{\text{ج د اب}}$$

(۶) ثابت کرو کہ دوسرے اور تیسرے حروف کو باہم بدلنے سے یا پہلے اور چوتھے حروف کو باہم بدلنے سے چلیبی نسبت کی قیمت ۱- لہ جاتی ہے یعنی

$$(\text{ا ج ب د}) = (\text{ب د ا ج}) = (\text{ج ا د ب}) = (\text{د ب ج ا}) = ۱ - ۱$$

اشارہ۔ چونکہ $\text{اب} \times \text{ج د} + \text{با} \times \text{د ج} + \text{اد} \times \text{ج ب} + \text{د ا} \times \text{ب ج} = ۰$

$$\text{اس لیے } \frac{\text{اب} \times \text{ج د}}{\text{اد} \times \text{ج ب}} - ۱ + \frac{\text{ج ا} \times \text{ب د}}{\text{اد} \times \text{ج ب}} = ۰$$

$$\text{اس لیے } ۱ - \frac{\text{ج ا} \times \text{ب د}}{\text{اد} \times \text{ج ب}} = \frac{\text{ا ج} \times \text{ب د}}{\text{اد} \times \text{ج ب}} = (\text{ا ج ب د})$$

اسی طرح سے باقی کی تین چلیبی نسبتوں کے لیے بھی۔

(۷) ثابت کرو کہ


$$(۱) (\text{ا د ب ج}) = (\text{ب ج ا د}) = (\text{ج ب د ا}) = (\text{د ا ج ب}) = \frac{۱}{\text{ا ج ب د}}$$

$$(ب) (\text{ا ب د ج}) = (\text{ب ا ج د}) = (\text{ج د ب ا}) = (\text{د ج ا ب}) = ۱ - \frac{۱}{\text{ا ج ب د}}$$

(ج) (اج دب) = (ب د ج ا) = (ج ا ب د) = (د ب ا ج) = لہذا
(۸) ثابت کرو کہ چار ہم خط نقطوں ا، ب، ج، د کو مختلف ترتیبوں میں
لینے سے ۲۴ چلیبی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں جن سے چار چار مساوی القیمت چلیبی
نسبتوں کے چھ سٹ (Set) بنتے ہیں۔

۸۸۔ تعریضات - متقدّم تراکز خطوں کو خطوں کی پنسل
کہتے ہیں۔ اور پنسل کے ہر خط کو شعاع کہتے ہیں اور پنسل کی شعاعوں کے نقطہ
تراکز کو پنسل کا رأس کہتے ہیں۔

پنسل کی شعاعوں کو کاٹنے والے کسی خط کو پنسل کا قاطع کہتے ہیں۔
مسئلہ - اگر چار شعاعوں و ا، و ب، و ج، و د سے بننے والی ایک پنسل کو
و قاطع بالترتیب تقاطع ا، ب، ج، د اور ا، ب، ج، د پر قطع کریں تو (ا ب ج د) = (ا ب ج د)



$$(ا ب ج د) = \frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب} = \frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب} = \frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب}$$

$$\frac{\frac{ا}{د} \times \frac{ب}{ج} \times \frac{ج}{ا} \times \frac{د}{ب}}{\frac{ا}{د} \times \frac{ب}{ج} \times \frac{ج}{ا} \times \frac{د}{ب}} =$$

جہاں زاویوں کی علامتوں کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔

$$\frac{\text{جب اوب} \times \text{جب ج ود}}{\text{جب اود} \times \text{جب ج وب}}$$

اسی طرح سے (ا ب ج د) = $\frac{\text{جب اوب} \times \text{جب ج ود}}{\text{جب اود} \times \text{جب ج وب}}$

چونکہ پنسل کے قاطعوں کے تمام مقامات کے لیے

$$\frac{\text{جب اوب} \times \text{جب ج ود}}{\text{جب اود} \times \text{جب ج وب}} = \frac{\text{جب اوب} \times \text{جب ج ود}}{\text{جب اود} \times \text{جب ج وب}}$$

ہیں لیے ثابت کرو کہ (ا ب ج د) = (ا ب ج د)

نوٹ (۱)۔ یہ طریقہ اُن صورتوں پر بھی حاوی ہے جبکہ قاطع پنسل کی ایک

یا ایک سے زیادہ محدودہ شعاعوں کو قطع کرے۔ قاطع کے مختلف مقامات کے لیے طالب علم مناسب شکلیں کھینچ کر ثبوت یہم پہنچائے۔

نوٹ (۲)۔ مسئلہ بالا میں یہ ثابت ہوا کہ اگر چار شعاعوں واوب، وج، ود

سے بننے والی پنسل کو کوئی قاطع نقاط ا، ب، ج، د پر قطع کرے تو صف ا ب ج د کی

چلیپی نسبت قاطع کے مقام پر منحصر نہیں ہے بلکہ پنسل کی شعاعوں کے درمیانی زاویوں پر

منحصر ہے۔ اس متقل چلیپی نسبت کو پنسل کی چلیپی نسبت کہتے ہیں اور اسے علامت

(ا ب ج د) سے تعبیر کرتے ہیں۔

۸۹۔ تعریفات۔ اگر ایک خط مستقیم اج کی داخلی اور خارجی تقسیم

ایک ہی نسبت میں ب اور د پر کی جائے [یعنی اگر $\frac{ب}{ا} = \frac{د}{ج}$] تو

یوں کہا جاتا ہے کہ اج کی موسیقی تقسیم ب اور د پر ہوئی ہے۔ اور صف ا ب ج د

د ب ج ا

موسیقی صف کہتے ہیں نیز نقاط ا اور ج کے لحاظ سے نقاط ب اور د ایک دوسرے کے

موسیقی مزدوج کہلاتے ہیں۔

$$\frac{\text{ا ب} \times \text{ج د}}{\text{ا د} \times \text{ب ج}} = \frac{\text{ا ب} \times \text{ج د}}{\text{ا د} \times \text{ب ج}}$$

$$= \frac{\text{ا ب}}{\text{ب ج}} \div \frac{\text{ا د}}{\text{د ج}} = ۱$$

پس صف اب ج د موسیقی صف ہوگی اگر اس کی چلیبی نسبت (اب ج د) = ۱۔
یعنی وہ صف جس کی چلیبی نسبت۔ اکے مساوی ہے موسیقی صف ہے۔
یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ا اور ج کے لحاظ سے ب اور د ایک دوسرے کے
موسیقی مزدوج ہیں موسیقی صف اب ج د کو (اج ب د) = ۱۔ سے بھی
تعبیر کرتے ہیں۔

۹۔ مسئلہ۔ اگر (اج ب د) = ۱۔ اتو (د ب ج ا) = ۱۔

د ب ج ا

از روئے تعریف $\frac{ا ب}{ب ج} = \frac{ا د}{د ج}$

اس لیے تبدیل نسبت سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{د ج}{ب ج} = \frac{ا د}{ا ب}$$

$$\frac{د ج}{ج ب} = \frac{د ا}{ا ب} \quad \text{یعنی}$$

یعنی (د ب ج ا) = ۱۔

۱۰۔ مسئلہ۔ اگر (اب ج د) = ۱۔ اتو اب، اج، اد کے طول موسیقی سلسلہ میں ہونگے

چونکہ (اب ج د) = ۱۔

$$\text{اس لیے } \frac{ا ب \times ج د}{ا د \times ج ب} = ۱۔$$

$$\text{یعنی } \frac{ا ب (ا د - ا ج)}{ا د (ا ب - ا ج)} = ۱۔$$

یعنی $ا ب \times ا د - ا ب \times ا ج = ا د \times ا ب + ا د \times ا ج$

طرفین کو اب $ا ج \times ا د$ پر تقسیم کرنے سے

$$\frac{ا ج}{ا د} - \frac{ا ج}{ا د} = \frac{ا ج}{ا د} + \frac{ا ج}{ا ب}$$

یعنی $\frac{اب}{اج} = \frac{اج}{اد} = \frac{اد}{ا$

یعنی $\frac{اب}{اج} = \frac{اج}{اد} = \frac{اد}{ا$ سلسلہ حسابیہ میں ہیں۔

یعنی طول اب، اج، اد موسیقی سلسلہ میں ہیں۔

۹۲۔ مسئلہ۔ اگر (اج، ب د) = ۱ اور ب د کا وسطی نقطہ
و ہو تو $وا \times وج = وب$

$\frac{وا}{اج} = \frac{اج}{ب د}$

چونکہ (اج، ب د) = ۱

اس لیے $\frac{اب}{بج} = \frac{اج}{دج}$

یعنی $\frac{وب - وا}{وج - وب} = \frac{ود - وا}{وج - ود}$

یعنی $\frac{وب - وا}{وج - وب} = \frac{وب + وا}{وج + وب}$ کیونکہ $ود = -وب$

یعنی $\frac{وج + وب}{وج - وب} = \frac{وب + وا}{وب - وا}$ (تبدیل نسبت)


یعنی $\frac{وج}{وب} = \frac{وب}{وا}$ (ترکیب تفصیل نسبت)

یعنی $وا \times وج = وب$

۹۳۔ مسئلہ۔ اگر (اج، ب د) = ۱ اور قطرب د پر

کھینچے ہوئے دائرہ پر کوئی نقطہ ن ہو تو $\frac{ن}{بج} = \frac{اب}{بج}$

فرض کرو کہ ب د کا وسطی نقطہ ہے
ن ا، ن ب، ن ج، ن و کو ملاؤ



سابقہ مسئلہ کی رو سے

$$وا \times وج = وب^2$$

$$ون =$$

یعنی ون مکس ہے ا ن ج کے حاطط دائرہ کا

$$(۱) \dots\dots\dots ون ج = ن ا ب$$

چونکہ وب = ون

اس لیے ون ب = وب ن

$$(۲) \dots\dots\dots ون ج + ج ن ب = ن ا ب + ا ن ب$$

(۱) اور (۲) سے حاصل ہوتا ہے


$$ج ن ب = ا ن ب$$

یعنی ن ب داخلی منصف ہے ا ن ج کا

$$اس لیے \frac{ن ب}{ن ج} = \frac{ا ب}{ب ج} \text{ یہی ثابت کرنا تھا۔}$$

۹۴۔ مسئلہ - اب ج د ایک موسیقی صف ہے اس کے باہر کوئی

نقطہ ہے۔ اگر ج میں سے ایک خط ف ج ق خط و ا کے متوازی کھینچا جائے
جو ب سے ف پر اور د سے ق پر ملے تو ف ج = ج ق۔



متشابه مثلثوں اب و اور ج ب ف میں

$$(۱) \dots\dots\dots \frac{ا ب}{ب ج} = \frac{و ف}{ف ج}$$

نیز متشابه مثلثوں ا د و اور ج د ق میں

$$(۲) \dots\dots\dots \frac{ا د}{ج د} = \frac{و ق}{ج ق}$$

لیکن چونکہ اب ج د موسیقی صف ہے

$$(۳) \dots\dots\dots \frac{ا ب}{ب ج} = \frac{ا د}{ج د}$$

نتائج (۱)، (۲)، (۳) سے حاصل ہوتا ہے کہ

$$\frac{ا}{ج} = \frac{و}{ق}$$


اس لیے $ف ج = ج ق$

عکس۔ اگر اب ج د ایک صف ہو اور اس کے باہر ایک نقطہ

و ہو اور ج سے و کے متوازی ایک خط ف ج ق کھینچا جائے جو و ب سے ف پر اور و د سے ق پر ملے اور اگر $ف ج = ج ق$ تو اب ج د ایک موسیقی صف ہوگی۔
 اس مسئلہ کا ثبوت اوپر کے مسئلہ کے ثبوت کے استدلال کو الٹنے سے طالب علم خود حاصل کرے۔

۹۵۔ مسئلہ۔ اگر اب ج د ایک موسیقی صف ہو اور اس کے

باہر کوئی نقطہ و ہو تو و ا، و ب، و ج، و د ہر قاطع کو ایک موسیقی صف پر قطع کریں گے۔



فرض کرو کہ کوئی دوسرا قاطع خطوط د، ا، و، ب، ج، و د کو بالترتیب
نقاط ا، ب، ج، د پر قطع کرتا ہے۔

نقاط ج اور ج میں سے خطوط ف ج ق اور ف ج ق خط
و ا کے متوازی کیسے ہو۔

چونکہ (ا ب ج د) ایک موسیقی صف ہے اس لیے ف ج = ج ق
اس لیے ف ج = ج ق
اور دفعہ گزشتہ کے مسئلہ کے عکس سے حاصل ہوتا ہے کہ ا ب ج د
ایک موسیقی صف ہے۔

تعریفیات۔ اگر نسل و (ا ب ج د) ایسی ہو کہ اس کے ایک

مخصوص قاطع (اور اس لیے مسئلہ بالا کی رو سے اس کے ہر قاطع پر) ایک موسیقی صف
حاصل ہوتی ہو تو ایسی نسل کو موسیقی نسل کہتے ہیں۔ اور شعاعوں و، ب، و د کو
بحفاظ شعاعوں و، ا، و ج کے ایک دوسرے کی موسیقی مزدوج شعاعیں کہتے ہیں۔

نوٹ (۱)۔ گزشتہ ترقیم کے اصول پر موسیقی نسل و (ا ب ج د) کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

و (ا ب ج د) = ا یا و (ا ب ج د) = ۱۔

نوٹ (۲)۔ دفعہ ۴ کے مسئلہ کی رو سے (ا ب ج د) = (ا ب ج د) اور

چونکہ حسب مفروض (ا ب ج د) = ۱ اس لیے ثابت ہوا کہ (ا ب ج د) = ۱۔
یہ مسئلہ بالا کا متبادل ثبوت ہے۔

تعریفیات۔ ایسے چار خطوط مستقیم کے نظام کو جن میں سے کوئی تین


متزا کر نہیں ہیں، مکمل ذواربعتہ الاضلاع کہتے ہیں۔

یہ چار خطوط مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے ضلعے کہلاتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے ضلعے ا، ب، ج، د ہیں۔

نیز فرض کرو کہ ا، ب، ج، د کا نقطہ تقاطع گ ہے اور ا، د اور ب، ج کا
نقطہ تقاطع ف ہے۔ پس مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے ضلعوں میں سے دو دو کے
تقاطع سے چھ نقطے ا، ب، ج، د، ف، گ حاصل ہوتے ہیں۔ ان نقطوں کو

مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے چھ راس کہتے ہیں۔



مقابل کے راسوں کو ملانے والے تین خطوط یعنی 'اج'، 'ب' اور 'ف' گ کو مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے تین قطر کہتے ہیں۔

۹۷۔ مسئلہ۔ مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے کوئی دو قطر دوسرے قطر

کی موسیقی تقسیم کرتے ہیں۔
دفعہ گزشتہ کی ترقیم کے مطابق مکمل ذواربعتہ الاضلاع کے قطر 'اج'، 'ب' اور 'ف' گ ہیں۔


فرض کرو کہ قطر 'اج' کو دوسرے دو قطر 'ب' اور 'ف' گ بالترتیب نقاط 'لا' اور 'ما' پر قطع کرتے ہیں۔

ثابت کرنا ہے کہ 'اج' ما موسیقی صنف ہے۔

فرض کرو کہ 'ف' لا اور 'ا' ب کا نقطہ تقاطع 'ل' ہے۔

مشکت 'ف' 'ا' ب کے راسوں سے گزرنے والے خط 'اج'، 'ب' د

اور فل متراکز ہیں۔



اس لیے سیوا کے مسئلہ سے

$$(۱) \dots\dots\dots ۱ + = \frac{ا ل}{ل ب} \times \frac{ب ج}{ج ف} \times \frac{ف د}{د ا}$$

نیز مثلث ف ا ب کے ضلعوں پر کے تین نقطے گ، ج، د ہم خط ہیں۔
اس لیے مدینی لاس کے مسئلہ سے

$$(۲) \dots\dots\dots ۱ - = \frac{ا گ}{گ ب} \times \frac{ب ج}{ج ف} \times \frac{ف د}{د ا}$$

نتیجہ (۱) اور (۲) سے حاصل ہوتا ہے کہ


$$\frac{ا ل}{ل ب} = \frac{ا گ}{گ ب}$$

یعنی ا ل ب گ موسیقی صنف ہے

اس لیے پنیل ف (ا ل ب گ) موسیقی پنیل ہے۔
 اس لیے اس پنیل کے قاطع ا ما پر موسیقی صف ا ل ج ما حال ہوتی ہے۔
 پس ثابت ہوا کہ مکمل ذواربعۃ الاضلاع کے قطرب د اور ف گ تیسرے
 قطراج کی موسیقی تقسیم کرتے ہیں۔
 اسی طرح سے دوسرے دو قطروں ب د اور ف گ کے لیے بھی
 مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۲

- (۱) خط ا ب کا وسطی نقطہ لاجے ا اور ب کے لحاظ سے
 نقطہ لا کا موسیقی مزدوج کہاں ہے؟
- (۲) مثلث ا ب ج کے زاویہ ا کے منصف ا ل اور ا ما ہیں۔
 ثابت کرو کہ ا (ب ل ج ما) موسیقی پنیل ہے۔
- (۳) مثلث ا ب ج کے حائط دائرہ کا ایک طرف ق ضلع ب ج
 پر عمود وار ہے ثابت کرو کہ ا (ق ب ف ج) موسیقی پنیل ہے۔
- (۴) ا اور ب دو ثابت نقطے ہیں ج د کوئی خط ہے جو ا ب کے
 متوازی نہیں ہے ج د پر ایک نقطہ ن ایسا معلوم کرو کہ ا ن ب کا
 ایک منصف خط ج د ہو۔
- (۵) ا ب ج ایک مثلث ہے اور ن ایک ثابت نقطہ ہے جو مثلث
 کے اضلاع پر نہیں ہے۔ ن میں سے ایک خط کھینچو جو مثلث کے اضلاع
 ا ب، ب ج، ج ا سے ایسے نقاط ف، ق، سر پر ملے کہ (ن ف ق سر) = ا۔
- (۶) ا ب ج د ایک متوازی الاضلاع ہے، ب د کے متوازی
 ا ع کھینچا گیا ہے ثابت کرو کہ ا (ب د ج ع) = ا۔
- (۷) ایک دائرہ کے قطر ا ب ممدودہ پر کے کسی نقطہ لا سے
 دائرہ کا ایک مماس لائن کھینچا گیا ہے اور ت سے ا ب پر عمود ت ما
 ہے۔ ثابت کرو کہ لا ا اور لا ب کا حسابی اوسط لا و ہے، ہندسی



اوسط کلات ہے اور موسیقی اوسط لا ما ہے۔

(۸) شکل بالائیں ثابت کرو کہ (ا ب، ما لا) = ا۔

(۹) شکل بالائیں اگر لا سے گزرنے والا کوئی خط دائرہ سے

ف اور ق پر اور ف ما سے ن پر ملے تو ثابت کرو کہ لا ف ن ق
موسیقی صفا ہے۔

(۱۰) دو دائرے (و م) اور (و م) ایک دوسرے کو عمود وار

قطع کرتے ہیں۔ اگر دائرہ (و م) کا کوئی قطر ا ب دائرہ (و م) سے ف اور ق
پر ملے تو ثابت کرو کہ (ا ب، ف ق) = ا۔

(۱۱) و (ا ب ج د) موسیقی پٹیل ہے۔ اگر ا و ج قائمہ زاویہ

ہو تو دفعہ ۹۴ کی مدد سے ثابت کرو کہ ب و د کے منصف و ا، و ج

ہیں۔ [مقابلہ کرو دفعہ ۹۳ کے ساتھ]


(۱۲) ایک خط پر تین نقطے ا، ب، ج دیے گئے ہیں۔ صرف

پٹری کو استعمال کرتے سے دفعہ ۹۴ کی مدد سے اسی خط پر نقطہ دایا معلوم

کرو کہ (ا ب ج د) = ا۔

(۱۳) و ا، و ب، و ج تین دیے ہوئے خط ہیں۔ خط و د

ایسا کھینچو کہ و (ا ب ج د) = ۱ -
 (۱۴) دو دائرے ایک دوسرے کو ب اور ج پر قطع کرتے ہیں اور
 ان دائروں کا ایک مشترک مماس دائروں کو ف اور ق پر منس کرتا ہے ب اور
 ج میں سے گزرنے والا کوئی دائرہ خط ف ق سے ل اور م پر ملتا ہے
 ثابت کرو کہ (ف ق ل م) = ۱ -



صحت نامہ

علم ہندسہ مستوی
(بار دوم)

| نہا | غلط | صحیح | نہا | غلط | صحیح |
|-----|-------|--------|-----|-----------------------------------|------------------|
| ۸ | ۲۱ | ج - تو | ۵۷ | ن - ف | ن، ف |
| ۲۶ | ۱۴ | ب ا ج | ۶۸ | ب د | ا ب د |
| ۳۹ | ۱۴ | یہ | ۸۲ | میں خط ع ط کو کچھ آگے بڑھایا جائے | |
| ۴۲ | آخری | ہونگے | ۵ | (و) اور (و) | (و) اور (و) |
| ۴۹ | ۶ | شکل ۱ | ۹۶ | ط | ط |
| ۵۳ | شکل ۲ | ب د ج | ۱۰۵ | کھینچو جو دو دیے | کھینچو جو دو دیے |
| ۵۴ | ۱۳ | ب | ۱۱۵ | قیمتیں | قیمتیں |
| ۵۵ | ۱۹ | ا ب | ۱۱۶ | شکل | شکل |

Handwritten text in Urdu script, likely a title or subject.

Handwritten text in Urdu script, likely a subtitle or author's name.

Handwritten text in Urdu script, likely a date or page number.





**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**